

Птицы нашего леса

Никонов Дмитрий
ученик 2 «А» класса
школа №33

Каменка обыкновенная



Обыкновенная каменка-представитель большой группы каменок нашей страны в основном обитателей открытых пространств, гор, степей и пустынь. Исходно каменки сформировались как группа горных или горностепных птиц.

Дрозды



Птиц этого семейства, во всяком случае многих из них, мы сначала услышим, а затем увидим.

Дрозды более или менее многочисленны и широко распространены птицы. Летом они питаются насекомыми и дождевыми червями, которых выбирают из лесной подстилки, а осенью переключаются на ягоды.

Воробей



Воробей относится к семейству ткачиковых . Воробьи живут самостоятельно, но очень многие селятся в самом не посредственном близости от человека. Порой, неожиданно воробей вспоминает что он из семейства ткачиковых , знаменитых гнездо строителей и пытаются соорудить нечто оригинальное, что -то на подобие шара с трубообразным выходом. Но случается это очень редко.

Ворона серая



Вороны - на редкость интересные птицы. Среди птиц ворона занимает одно из первых мест по уровню развития высшей нервной деятельности. Она обладает чрезвычайно высокой способностью ориентироваться даже в очень сложной обстановке. Вороны проявляют изумительную изобретательность, например при ограблении птичьих гнёзд.

Пищуха



Бока чисто-белые, надхвостье чуть красноватое, коготь заднего пальца длиннее самого пальца. Хорошо лазает снизу вверх по деревьям и скалам, опираясь на хвост. Встречается в старых парках. Легче всего найти её зимой там, где кормится стайка синиц. Питается преимущественно насекомыми. Кормится на стволах деревьев. Гнездится главным образом в старых смешанных и лиственных участках леса. Оседла или совершает недалёкие кочёвки в стаях птиц.

Неясыть




Неясыть- птица относящаяся к семейству настоящих сов, отряду совообразных. Её длина достигает 70 см, размах крыльев около 115, длина крыла около 35-40, хвоста 30см. Между самцом и самкой нет никакого различия. Обитает преимущественно в высокоствольных смешанных лесах .

Конюк



Хищная птица. Обитает в холмистых участках хвойных лесов недалеко от открытых пространств. Живёт канюк обыкновенный в среднем в природных условиях 26 лет, в неволе около 30 лет. Охотится на открытых пространствах, медленно паря в воздухе. Питается мелкими млекопитающими: сусликами, крысами и мелкими птицами. Может поедать падаль.

Дятел



Величиной с ворону. Окраска матово-чёрная, глаз белый. Усамца верх головы, у самки затылок малиново-красные. Населяет большие высокоствольные леса - еловые, сосновые. Предпочитает участки леса с загнивающими, сухостойными и поваленными деревьями, а также расположенные по соседству со старыми вырубками с трухлявыми пнями. Гнездо обычно устраивает на труднодоступных высоких с гладкими стволами деревьях, чаще всего осинах и соснах.

Свиристель



Размером со скворца с густым пушистым оперением и большим хохолком на голове. Окраска розовато-серая, крылья чёрные с жёлтыми и белыми, хвост, горло и полоска через глаз чёрные. Кончики второстепенных маховых перьев превращены в маленькие ярко-красные пластинки. Заметные только вблизи. Летом питается насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами и молодыми побегами растений.

Синица большая



С начала гнездового периода до поздней осени большая синица-обитатель лесов, садов, парков. А уже по первозимью большаки тяготеют к человеческому жилью, очищая от насекомых городские и приусадебные насаждения, перебиваясь с воробьями возле помоек, выискивая подкормку на подоконниках. При этом смыслённые пичуги не прочь растеребить вывешенный за форточку свёрток с мясом, маслом и салом.

Сорока обыкновенная



Сорока имеет удивительно красивую внешность, тело компактное, средней величины, но с длинным ступенчатым хвостом и короткими крыльями. Окраска очень контрастная. Населяет сорока древесные и кустарниковые насаждения в различных природных зонах. Избегает глухих лесов, но любит лесополосы. Во время ходьбы держит хвост поднятым вверх.

Снегирь



Одна из самых известных наших птичек. Он немного крупнее воробья, имеет пушистое оперение, среди которого особенно ярко выделяется красновато-розовая грудь у самцов (у самок она сероватая). Снегири обычно держатся небольшими стайками (7-10 птичек). Чем сильнее мороз, тем спокойнее сидит стайка, изредка передвигаясь, чтобы сорвать ягоду, отломить почку, а затем снова усесться неподвижно на некоторое время.

*Ребята, не забывайте
прикармливать
пернатых !*

*Вывешивайте
кормушки!*

The background of the image is a solid orange-brown color, overlaid with a pattern of stylized, semi-transparent autumn leaves in various shades of brown and orange. The leaves are scattered across the frame, creating a textured, seasonal feel.

Спасибо

за

ВНИМАНИЕ.