

РОЗМАЇТІСТЬ ПТАХІВ

Ряд Гусеподібні



Вчитель Світова Т.
О.

Гусеподібні (Anseriformes)

- вперше класифікував німецький вчений-біолог Йоганн Георг Ваглер) До гусеподібних входять три сучасні родини: Качкові (Anatidae), напівлапчасті гусаки (Anseranatidae) та Паламадеї (Anhimidae).
- Качкові поділяються на 9 підродин, тому є найбільшою родиною цього ряду.
- Справжні гуси складаються з одного роду, у якому лише один вид.
- Паламадеї, або крикуни включають у себе 2 роди. Раніше ця родина відносилась до куроподібних.
- Найбільше гусеподібні за фізичними характеристиками схожі на ряд гагароподібних.



Підродини качкових

Роди:

- Гусеві
- Ниркові качки
- Крехові
- Савки

Гуска (*Anser*)

Казарка (*Branta*)

Біла гуска (*Chen*)

Коскороб (*Coscoroba*)

Лебідь (*Cygnus*)

Нирок Netta

Чернь Aythya



Гага (*Somater*)

Турпан (*Melanitta*)

Морянка (*Clangula*)

Гоголь (*Bucephala*)

Крех (*Mergus*)

РІД ГУСКА

- Гуменник
- Гуменник
короткодзьобий
- Гуска білолоба
- Гуска мала
- Гуска сіра
- Гуска біла

hlasek
ek.com
thronus ai2131



РІД КАЗАРКА

- Казарка чорна
- Казарка американська
- Казарка канадська
- Казарка білощока
- Казарка червоновола

РІД ЛЕБІДЬ

- Чорний лебідь
- Чорноший лебідь
- Лебідь-шипун
- Лебідь-кликун
- Лебідь малий
- Лебідь-трубач
- Американський лебідь





РІД КОСКОРОБА



©Nick Athanas



РІД НИРОК

- Чернь
червонодзьоб
а
- Нирок



РІД ЧЕРНЬ


- Чернь
червоноголова
або Попелюх
- Чернь білоока
- Чернь чубата
- Чернь морська





РІД ГАГА

ГАГА ЗВИЧАЙНА
ГАГА СИБІРСЬКА
ГАГА ОЧКОВА
ГАГА ГРЕБІНУШКА







РІД ГОГОЛЬ



РІД МОРЯНКА





РІД КРЕХОВІ

- Крех великий
- Крех довгоносий
- Крех оклендський



РІД ТУРПАН

**БАЖАЄМО
УСПІХУ
У ВИВЧЕННІ
НОВИХ ТЕМ!**