





С наступающим!

13

Старый Новый год тоже праздник

Лекция № 16


Тема:

РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

Лечебный факультет
2008 / 2009 учебный год

13 января 2009 г.

Литература основная



Физиология человека

Под редакцией

В.М.Покровского,

Г.Ф.Коротко

Медицина, 2003 (2007) г.



С. 366-378.

Дополнительно



Физиология человека

Под редакцией

В.М.Покровского,
Г.Ф.Коротько

Медицина, 2003 (2007) г.



С. 21-25.



«Ежик шел-шел, забыл как дышать, Сел под дерево и умер»

Из английского юмора

Вопрос **1**



Под регуляцией внешнего дыхания понимают:



Под регуляцией внешнего дыхания понимают:

- **генерацию** базового дыхательного паттерна внешнего дыхания.
- **модуляцию** базового паттерна внешнего дыхания в соответствии с метаболической потребностью организма в разных условиях жизнедеятельности.

Говоря о регуляции в рамках физиологической системы, следует **ВЫЯСНИТЬ:**


- 1. что** регулируется (какие параметры)
- 2. как** регулируется

Основные регулируемые параметры



в системе дыхания

- Парциальное давление кислорода (pO_2) в артериальной крови.
- Парциальное давление углекислого газа (pCO_2) в артериальной крови.
- Водородный показатель (pH) артериальной крови.



Как регулируется ?



- Регуляция осуществляется через изменение паттерна дыхания (частоты и глубины),
- ведущее к оптимизации вентиляции легких.

Основные виды (кибернетические) регуляции дыхания




- **по отклонению** (отрицательная обратная связь с хеморецепторов при отклонении pO_2 , pCO_2 , pH артериальной крови);
- **по возмущению** (например, влияние на дыхательный центр с проприорецепторов и моторной коры при физической работе);
- **по прогнозированию** (например, условнорефлекторное влияние на дыхательный центр спортсмена-бегуна перед стартом).

Вопрос 2



Общий план строения (структура) системы управления

- **Управляющая**
часть
- **Управляемая**
часть
- Каналы связи



Или по Дж.Уэсту
(J. West, 1988; с
изменениями):



- Центральный регулятор
- Эффекторы
- Рецепторы



Центральный регулятор дыхания (управляющую часть системы)



Включает:

- дыхательные центры ствола головного мозга,
- гипоталамус,
- лимбическую систему,
- кору больших полушарий.

Эффекторы (управляемую часть системы)



Составляют:


- дыхательные мышцы

Рецепторы системы дыхания




- Хеморецепторы (центральные и периферические)
- Механорецепторы (легких, дыхательных мышц)

- Общую схему регуляции дыхания можно разбить на детали, например,



Или так : Схема регуляции дыхания




Вопрос 3



СТВОЛ ГОЛОВНОГО МОЗГА

К стволу мозга
(truncus cerebri)
относят

- продолговатый мозг,
- мост
- средний мозг.



Сакитальное сечение


На рисунке

- 1 - продолговатый мозг (myelencephalon) ;
- 2 - задний мозг (metencephalon) (мост мозжечок;
часть четвертого мозгового желудочка)
- 3 - средний мозг (mesencephalon) (четверохолмие,
сильвиев водопровод, ножки мозга)
- 4 - промежуточный мозг (diencephalon) ;
- 5 - конечный мозг (telencephalon)

Дыхательные центры ствола головного мозга



- Варолиева моста
 - Пневмотаксический (1)
 - Апнейстический (2)
- Продолговатого мозга
 - вентролатеральный (3)
 - Дорсомедиальный (4)



Медуллярный дыхательный центр

- Синонимы: бульбарный дыхательный центр.
- Расположен в ретикулярной формации в области дна IV желудочка у нижнего угла ромбовидной ямки

Большой вклад в
изучение его работы
внесли

М.Флуранс (1822 г.),

Н.А. Миславский
(1885 г.),

Р.Баумгартен (1956 г.).



МИСЛАВСКИЙ
Николай
Александрович
(1854–1929)

Медуллярный дыхательный центр


состоит из групп нейронов

локализованных в двух основных зонах продолговатого мозга:



- в дорсомедиальных отделах (**дорсальная дыхательная группа**) и активизирующихся главным образом **при вдохе**.
- в вентролатеральных отделах (**вентральная дыхательная группа**) и связана с **выдохом и вдохом**.

Дыхательные центры Варолиева моста



Пневмотаксический центр моста (Т.Лумсден, 1960).




- (греч.: πνέω - дышать, τάξις - расположение в порядок, устройство).
- Расположен в верхней части моста (медиальное парабрахиальное ядро).
- Эффект: тормозит инспираторные нейроны, ограничивает длительность вдоха и повышает ЧД.
- Перерезка в нижней части моста приводит к удлинению вдоха. При дополнительной перерезке блуждающих нервов происходит апнейзис (глубокие длительные вдохи, сопровождающиеся короткими выдохами).

Апнейстический центр



- (греч.: α- - в *СЛОЖНЫХ* словах - не- + πνέω - дышать).
- расположен в нижней части моста
- оказывает постоянную стимуляцию инспираторных нейронов, способствует вдоху и пролонгирует его.


Определение роли нейронов дыхательного центра ст головного мозга в управлении дыханием методом пере





- 1 – пневмотаксический центр,
 - 2 – апнейстический центр,
 - 3 – вентральная группа дыхательных нейронов,
 - 4 – дорзальная группа дыхательных нейронов,
- SC** – верхние холмики четверохолмия,
IC – нижние холмики четверохолмия,
CP – средние мозжечковые ножки (перерезаны).

Римскими цифрами обозначены последовательные поперечные полные перерезки ствола мозга.

Определение роли нейронов дыхательного центра ствола головного мозга в управлении дыханием методом перерезки



Определение роли нейронов дыхательного центра ствола головного мозга в управлении дыханием методом перерезки



- Перерезка на уровне I. Удаление коры головного мозга и мозжечка не оказывает заметного влияния на глубину и частоту ритмического дыхания. Если перед этой перерезкой или после нее пересечь блуждающий нерв, то это приводит к уменьшению частоты и к увеличению глубины дыхания.

- Перерезка на уровне II. Полная поперечная перерезка по нижней границе среднего мозга и по верхней границе Варолиева моста так же заметно не влияет на глубину и частоту ритмического дыхания. Если перед этой перерезкой или после нее пересечь блуждающий нерв, то это приводит к уменьшению частоты и к увеличению глубины дыхания.

- Результаты описанных перерезок позволяют предполагать, что информация, поступающая по афферентным волокнам блуждающих нервов, может использоваться структурами дыхательного центра, расположенными ниже среднего мозга, для управления частотой и глубиной дыхания.

- Перерезка на уровне III. Полная поперечная перерезка приблизительно на уровне между верхней третью и нижними двумя третями Варолиева моста, частота дыхания уменьшается, а глубина дыхания увеличивается. Эффект подобен тому, что наблюдался в первом эксперименте при пересечении блуждающих нервов. Однако если после перерезки на уровне III пересечь еще и блуждающие нервы, то можно наблюдать апнейстическое дыхание.

- **Апнейстическим дыханием** называют редкие затрудненные судорожные дыхательные движения с длительными паузами на высоте вдоха.

- Таким образом, без афферентной информации, поступающей по блуждающим нервам, и без влияния вышележащих структур, группа нейронов, расположенная в нижних двух третях моста чрезмерно активирует вдох и способствует возникновению апнейстического дыхания.

- Пневмотаксический и апнейстический центры моста, вероятно, являются ***тоническими пейсмекерами***, координирующими функцию ***ритмических пейсмекеров*** продолговатого мозга.

- Перерезка на уровне IV. При перерезке ствола мозга между нижним краем моста и продолговатым мозгом можно наблюдать дыхание в нерегулярном ритме. Заметно увеличивается вариативность как частоты, так и глубины дыхания.

- Последующая перерезка блуждающего нерва не оказывает заметного влияния на проявления предшествующей перерезки. Это приводит к предположению, что афференты блуждающего нерва направляются главным образом к структурам моста, но не к структурам продолговатого мозга.

- Перерезка на уровне V. Перерезка мозга по нижней границе продолговатого мозга приводит к полной остановке дыхания (апноэ) в конце выдоха.
- Это свидетельствует о том, что условием осуществления внешнего дыхания является целостность, по крайней мере структур продолговатого мозга, управляющих дыханием.

Вопрос 4



Автоматия дыхательного центра ствола головного мозга



- способность обеспечить смену вдоха и выдоха за счет своих внутренних механизмов при постоянной импульсации с хеморецепторов.
- находится под выраженным произвольным корковым контролем.

Генерация дыхательного ритма



- В течение дыхательного цикла выделяют три фазы активности дыхательных нейронов:
 - **инспираторную**
 - **постинспираторную**
 - **экспираторную**

Генерация дыхательного ритма



Фазы дыхательного цикла

Инспираторная	Постинспираторная	Экспираторная
---------------	-------------------	---------------

Активность диафрагмального нерва





Активность наружных межреберных мышц




Активность внутренних межреберных мышц



Дыхательные нейроны



Дыхательные нейроны



ранние инспираторные нейроны — интернейроны, которые активны в начале вдоха (расположены в вентролатеральной группе);

полные инспираторные нейроны — эфферентные нейроны центра, иннервирующие мотонейроны мышц вдоха, активны в течение всего вдоха (расположены в дорсомедиальной и вентролатеральной группах);

поздние инспираторные нейроны — эфферентные нейроны центра, иннервирующие мотонейроны мышц вдоха и активные в конце вдоха (расположены в дорсомедиальной и вентролатеральной группах);

Дыхательные нейроны

Фазы дыхательного цикла



ранние инспираторные нейроны — интернейроны, которые активны в начале вдоха (расположены в вентролатеральной группе);

полные инспираторные нейроны — эфферентные нейроны центра, иннервирующие мотонейроны мышц вдоха, активны в течение всего вдоха (расположены в дорсомедиальной и вентролатеральной группах);

поздние инспираторные нейроны — эфферентные нейроны центра, иннервирующие мотонейроны мышц вдоха и активны в конце вдоха (расположены в дорсомедиальной и вентролатеральной группах);

Дыхательные нейроны

Фазы дыхательного цикла



постинспираторные нейроны — интернейроны, активные в первой половине выдохи, тормозящие как инспираторные, так и экспираторные нейроны (расположены в ростральной вентролатеральной группе);

экспираторные нейроны — эфферентные нейроны центра, иннервирующие мотонейроны мышц выдоха и активные во второй половине выдоха, преимущественно при усиленном выдохе (расположены в каудальной вентролатеральной группе);

преинспираторные нейроны — интернейроны, блокирующие возбуждение экспираторных нейронов и способствующие смене выдоха на вдох.

Инспираторная фаза

- Соответствует вдоху.
- Обусловлена последовательной активацией ранних, полных и поздних инспираторных нейронов, что сопровождается линейным нарастанием их суммарной активности.
- Резкое уменьшение их активности (смена вдоха на выдох), как полагают, связано с активацией особых тормозных нейронов, возбуждение которых осуществляется от нейронов пневмотаксического центра моста и от рецепторов растяжения легких.

Постинспираторная фаза

- Соответствует первой половине выдоха (пассивная экспирация) и обусловлена особыми постинспираторными нейронами, которые тормозят как инспираторные, так и экспираторные нейроны.
- Они, вероятно, обеспечивают интервал времени, необходимый для выведения воздуха из легких за счет их эластической тяги;

Экспираторная фаза

- Соответствует второй половине выдоха (активная экспирация) и обусловлена активацией экспираторных нейронов, иннервирующих мотонейроны мышц выдоха.
- В конце выдоха происходит возбуждение преинспираторных нейронов, которые тормозят импульсацию экспираторных нейронов (прекращают выдох).
- Возможным источником возбуждения преинспираторных нейронов являются ирритантные рецепторы легких, возбуждающиеся при уменьшении объема легких во время выдоха (инспираторно-облегчающий рефлекс Геринга—Брейера).
- При частом дыхании экспираторная фаза может быть не выражена, и постинспираторная фаза непосредственно переходит в следующую фазу инспирации.

Вопрос 5




Гуморальные факторы, участвующие в регуляции дыхания

pO_2 , pCO_2 , pH

- стимулируют легочную вентиляцию
 - гиперкапния (МВЛ увеличивается до 80 л/мин),
 - гипоксемия и ацидоз (МВЛ увеличивается до 30 л/мин);
- уменьшают легочную вентиляцию гипокапния, гипероксия и алкалоз.

Периферические хеморецепторы:



- Локализуются в сосудах (особенно в артериях), тканях внутренних органов, их концентрация максимальна в синокаротидной и аортальной зонах;

КАРОТИДНЫЙ СИНУС


[carotid sinus]




- (Греч.: карόω - погружать в глубокий сон, лишать чувств, оглушать; лат.: sinus - выпуклость, вздутие; 1923).

Каротидный синус - это расширение общей сонной артерии в месте её разветвления на наружную и внутреннюю сонные артерии.


Периферические хеморецепторы:



- хеморецепторные клетки (вторичные рецепторы) контактируют с капиллярами клубочкови друг с другом посредством щелевых контактов и образуют синаптические контакты с окончаниями афферентных волокон;



- Афферентная импульсация от них проводится по нерву Циона—Людвига (ветвь X нерва) от аортального тельца и нерву Геринга (ветвь IX нерва) от каротидного тельца;




- реагируют на все три стимула;
- имеют высокую чувствительность к изменению pO_2 артериальной крови (особенно к его снижению),
- в меньшей степени реагируют на изменения pCO_2 и pH ,

Периферические хеморецепторы:

- Хеморецепторы находятся под эфферентным контролем ЦНС;
- Имеют короткое латентное время действия на дыхательный центр (~5 с).


Механизм возбуждения



Механизм возбуждения

- снижение pO_2 и повышение pCO_2 и pH приводит к уменьшению внутриклеточного pH,
- что уменьшает проводимость K^+ -каналов плазмолеммы.
- Возникающая деполяризация мембраны открывает Ca^{2+} -каналы,
- вход Ca^{2+} в клетку стимулирует экзоцитоз медиатора (дофамина) в синапсе.
- В отходящем от хеморецептора афферентном волокне возникает ПД.

Центральные хеморецепторы (хеморецепторная зона дыхательного центра):




Thus, pCO_2 in blood \uparrow \rightarrow
 pH in cerebrospinal fluid \downarrow

- Локализуются на переднебоковой поверхности продолговатого мозга и моста в виде трех пар скоплений нейронов;

Центральные хеморецепторы (хеморецепторная зона дыхательного центра):

- Отличаются высокой чувствительностью к изменению рН (пороговые колебания рН примерно 0,01) и $p\text{CO}_2$ в ликворе;
- Имеют длительное латентное время действия на дыхательный центр (25 с).

Сравнительная характеристика раздражителей дыхательной системы





Вопрос 6



Гипоталамус

- Осуществляет связь дыхания с обменом веществ и терморегуляцией в организме.
- Регулирует дыхание для обеспечения поведенческих актов, направленных на удовлетворение биологических потребностей (агрессивно-оборонительной, пищевой, половой и др.).

Лимбическая система

- Осуществляет связь дыхания с вегетативной регуляцией внутренних органов и эмоциями.

Кора больших полушарий

- По пирамидным путям, минуя дыхательный центр, оказывает влияние непосредственно на спинальные моторные центры дыхательных мышц (поэтому при некоторых поражениях пирамидных путей произвольное дыхание сохранено, а устная речь, произвольный кашель нарушены).
- Осуществляет условнорефлекторную и произвольную регуляцию дыхания.
- Осуществляет корковое дублирование автоматии дыхательного центра (например, при поражении периодической деятельности дыхательного центра — синдроме Ундины).
- Регулирует дыхание для обеспечения социальных форм поведения.
- Регулирует дыхание при образовании речи.

Синдром "Проклятие Ундины" ("La Malediction d'Ondine")

- встречающийся при нарушении работы дыхательного центра.
- При нем человек вообще не может самостоятельно дышать во время сна.
- Пациента (днем - вполне здорового человека) подключают на ночь к аппарату искусственной вентиляции легких!
- Считается самым тяжелым видом апноэ (отсутствие дыхания).
- В основу названия положена легенда, согласно которой водяная фея Ундины, обманутая мужем, лишает его всех автоматических функций, по некоторым данным с помощью затащенного поцелуя.
- С этого момента он должен постоянно помнить, что ему нужно дышать, держать в поле внимания акт ходьбы, все действия руками и т. д. Заснув, он умирает, так как перестает управлять волевыми усилиями дыхательным центром и другими жизненно важными функциями

Вопрос 7



- С механорецепторов легких регулируется частота и глубина дыхания:

Рецепторы растяжения легких

- Медленно адаптируются.
- Расположены в гладких мышцах трахеи и бронхах, реагируют на увеличение объема легких при вдохе; с них возникает инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга—Брейера (если дыхательный объем более 1 л);

- ***Ирритантные рецепторы***
- Быстро адаптирующиеся рецепторы, порог раздражения которых выше, чем рецепторов растяжения легких;
- Расположены в эпителии бронхов, реагируют на быстрое изменение объема легких, на механические воздействия (пыль) и пары химических веществ:
- С них формируются рефлекс кашля, сужения бронхов при выдохе, инспираторно-облегчающий рефлекс Геринга — Брейера при спадении легких, который укорачивает выдох и способствует его смене на вдох;

- ***Юкстаальвеолярные рецепторы (J-рецепторы)***
- Локализуются в интерстиции альвеол у капилляров, реагируют на давление жидкости в межклеточном пространстве легких, с них формируются одышка и торможение у-мотонейронов (ограничение физической нагрузки при угрозе левожелудочковой недостаточности и отека легких).

Проприорецепторы дыхательных мышц

- Участвуют в компенсации дыхательных нагрузок:
- Локализуются в дыхательной мускулатуре, преимущественно в межреберных мышцах;
- Усиливают сокращение дыхательной мускулатуры при увеличении сопротивления дыханию, ослабляют — при уменьшении сопротивления дыханию.

Вопрос 8



С. 373 - 375.

Вопрос 9



С. 375 - 376.

Вопрос 10




С. 376 - 377.

Вопрос **11**



С. 377.

Вопрос 12



С. 378.