

РЯД ГОРОБЦЕПОДІБНІ



Характеристика ряду

- Ряд Горобцеподібні – найчисельніший ряд птахів (понад 5000 видів) Більшість горобцеподібних є малими птахами (за винятком родини Воронових). Вони поширені по всій земній кулі, крім Антарктиди. Види мають найрізноманітніші місця проживання – ліс, тундра, скелі, пустелі, поля, степи, міста або села. Проте, більшість горобцеподібних так чи інакше пов'язана з деревною рослинністю. Є серед них великі, наприклад ворона, і одні з найменших птахів, масою всього по 5-8 грамів, жителі ялинових і ялицевих крон – корольки.



В Україні зустрічається 130–135 видів горобцеподібних



- Горобцеподібні — нагніздні птахи, поширені по всій земній кулі (крім Антарктики). Живляться різноманітною їжею: частинами рослин, безхребетними тваринами, яйцями та пташенятами інших птахів. Багато представників — мігруючі птахи (ластівки, солов'ї, вівчарики), але серед них є також кочові (синиці, сойки, деякі дрозди) та осілі (хатній горобець). Горобцеподібні відіграють важливу роль у природі та житті людини. Комахоїдні види регулюють численність шкідників культурних рослин. Проте зерноїдні види можуть завдавати шкоди посівам. Самців багатьох видів люди цінують за красивий мелодійний спів (наприклад, соловейко, дрізд співочий, щиглик).



- Ряд Горобцеподібні налічує майже 5 тис. видів, що об'єднані в 55 родин. На території України найчисельніші представники таких родин, як Воронові, Шпакові, Ластівкові, Синицеві, Жайворонкові, Омелюхові, Дроздові, Ткачикові, Плискові.



Родина Воронові

- **Воронові** (Corvidae) — широко поширена родина птахів ряду горобцеподібних (Passeriformes), що включає таких птахів як ворони, граки, галки, горіхівки, круки, сороки і сойки. Родина складається з 115 видів птахів (26 родів), представлених на всіх континентах крім Антарктиди. Це зазвичай великі птахи у порівнянні з іншими горобцеподібними, більшість мають помітну зовнішню схожість. У багатьох представників родини оперення чорне, але є і яскраво забарвлені види. Харчуються переважно комахами, частково зернами. У крупних північних видів значне місце займає полювання за яйцями і пташенятами інших птахів, пошук падалі й збір різноманітних інших типів їжі.

• Крук



• Сойка



Родина Жайворонкові

- Довжина тіла 11—23 см, маса 15—70 г. Забарвлення у більшості маскувальне, буровато-сіре з численною строкатістю, подібне у обох статей. Поширені переважно в Африці, також в Євразії, Новому Світі, Австралії. Більшість моногами, гніздяться окремими парами. Гніздову територію самці позначають співом. Пісні у більшості — голосні та дзвінкі трелі.

ЖАЙВОРОНКИ



ПОСМІТЮХА
Galerida cristata



ЖАЙВОРОНОК СТЕПОВИЙ
Melanocorypha calandrinia



ЖАЙВОРОНОК ПОЛЬОВИЙ
Alauda arvensis



ЖАЙВОРОНОК РОГАТИЙ
Eremophila alpestris



• Родина Ластівкові

Ластівкові (Hirundinidae) — родина співочих горобцеподібних птахів.

Поширені по всій земній кулі, крім Антарктиди, Арктики і Нової Зеландії.

Для ластівкових характерна здатність здобувати їжу в повітрі, вони в змозі ловити комах на льоту. У всіх ластівкових струнке, обтічне тіло і довгі вузькі крила.

Гніздяться на скелях, будівлях тощо, деякі у норах, дуплах. Гнізда роблять з землі, скріплюючи їх слиною. У кладці 3—7 яєць; насиджують 13—20 діб. Нагніздні птахи.



В'юркові

Довжина тіла від 8 до 25 см, маса від 7 до 100 г. У забарвленні переважають досить яскраві кольори — жовті, зелені, червоні. Зустрічаються в , Америці, Африці

Гніздяться окремими парами або розсіяними групами. Більшість добре співають (самці), голоси мелодійні; пісня використовується для приваблювання самок та охорони гніздової території



Родина Синицеві

- **Синицеві** (Paridae) – родина птахів ряду Горобцеподібні (Passeriformes). Широко поширені в Євразії та на прилеглих островах, в Африці та невеликою кількістю видів представлені в Північній Америці.

Родина об'єднує птахів, подібних як за зовнішнім виглядом, так і за способом життя. Сюди належать дрібні птахи: довжина тіла у них 100–170 мм, вага – 7–23 г. Крила порівняно короткі та тупі.

Оперення густе та м'яке. Синиці роблять закриті гнізда, які розміщують їх зазвичай у дуплах дерев, рідше – між гілками та сучками гнізд хижих птахів, у норах, щілинах скель та інших укриттях. У кладці 4–6 до 14–16 яєць.

Представники



Синиця блакитна

Синиця чорна



Синиця чубата



Родина Довгохвостосиницеві

- Це дрібні за розміром птахи 9—14 см у довжину, включаючи довгий хвіст та вагою 4,4—9 г. Їхнє забарвлення зазвичай блідо сіре або коричневе

Усі представники — лісові птахи, які віддають перевагу узлісся та підліску.

Моногами. Пари можуть мати так званих помічників, які (одного або більше), які допомагають парі вигодовувати пташенят. Гніздо зазвичай кулеподібної форми, ззовні замасковане павутинням, лишайниками, а всередині вистелене пір'ям.

Птахи цієї родини більшу частину року тримаються зграйками по 6—12 особин.



Родина Вівсянкові

- **Вівсянкові** (Emberizidae) — родина птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes), що нараховує близько 560 видів, поширених у Старому та Новому Світі. Більшість птахів родини забарвлені відносно не яскраво. Населяють відкриті ландшафти — степи, лісостепи, тундри, в лісових ландшафтах оселяються на узліссі, вирубках, відкритих галявинах. Гнізда чашеподібної форми розташовують зазвичай на землі, рідше на кущах або в розщілинах скель. Кладка складається з 3—7 яєць з крапками на зеленуватому або блакитному фоні або (рідше) однотонні. Насиджування 8—14 днів. Основа живлення — різноманітне насіння, а влітку також комахи (ними вигодовують пташенят)

Представники









Родина Підкоришникові

Підкоришникові (Certhiidae) — родина птахів ряду Горобцеподібних. Дрібні птахи, що ведуть деревно-чагарниковий спосіб життя.

Довжина тіла 10—16 см, маса від 8 до 30 г. Забарвлені в сірувато-бурі, коричневі з білими крапками. Осілі або кочуючі птахи. Гнізда будують в укриттях: у дуплах, у порожнинах за відсталою корою (підкоришники).

Родина Мухоловкові

- **Мухоловкові** (Muscicapidae) — велика родина горобцеподібних птахів, поширена виключно в Старому Світі. Представники переважно є невеликими комахоїдними птахами, більшість з яких полюють в польоті. Середніх та невеликих розмірів птахи. Населяють різноманітні типи хвойних, мішаних хвойно-листяних і листяних лісів на рівнинах, у передгір'ї і горах, савани, зарості кущів, сади, парки. Деякі види можуть гніздитись в населених пунктах і навіть у відкритих ландшафтах.



- Мухоловка



Родина Кропив'янкові

- **Кропив'янкові** або **Славкові** (Sylviidae) — велика родина птахів ряду Горобцеподібних. Разом з Дроздовими є найбільшою родиною ряду. Довжина тіла від 7 до 28 см. Забарвлення неяскраве, з переважанням бурих, сірих, зеленувато-оливкових та рудуватих тонів, зрідка з пестринами, нижній бік тіла зазвичай світліший спини; у ряда тропічних форм забарвлення яскраве. У деяких виражений статевий диморфізм: самці забарвлені більш яскраво та контрастно, ніж самки.

Представники

Очеретянка лучна



- Очеретянка чагарникова





- Вівчарик весняний

- Вівчарик-ковалик













Дякую за увагу))