




Селекция

Лацковой Лизы 96

Селекция – это наука о методах создания новых и улучшении существующих пород животных, сортов культурных растений и штаммов микроорганизмов с ценными для человека признаками и свойствами

- **Порода, сорт, штамм** – это популяция организмов, полученных в результате селекции, которые характеризуются определенным генофондом, наследственно закрепленными морфологическими и физиологическими признаками и определенным уровнем продуктивности.

Задачи селекции



Методы селекции

Основными методами селекции являются гибридизация и отбор


Основой селекционной работы является искусственный отбор, позволяющий в короткое время и при ограниченном числе особей получить нужный сорт, породу или штамм

Методы отбора

Массовый отбор:
Применяется для получения сортов перекрестноопыляемых растений. Все потомки гетерозиготны. Результаты неустойчивые из-за случайного перекрестного опыления

Отбор:
Применяется для самоопыляемых растений. Отбираются отдельные растения и от них получают потомство, которое генетически однородно. Получают чистые линии

Естественный Отбор:
Формируется устойчивость к среде обитания. Получают районированные сорта и породы



Центры происхождения культурных растений: 1 – Тропический центр; 2 – Восточноазиатский; 3 – Среднеазиатский; 4 – Переднеазиатский; 5 – Средиземноморский; 6 – Абиссинский; 7 – Центральноамериканский; 8 – Южноамериканский.

Тропический центр

Включает территорию тропической Индии, Индо-Китая и островов Юго-Восточной Азии. Из этого центра ведет начало около 30% возделываемых в настоящее время растений.


Здесь родина риса, сахарного тростника, большого количества тропических плодовых и овощных культур (цитрусовые, баклажан, огурец и др.)




Восточнокитайский центр

Включает умеренные и субтропические части Центрального Китая, Корею, Японию и о. Тайвань.
Около 20% всей мировой культурной флоры ведет начало из Восточной Азии.


Это родина таких растений, как соя, проса, многих овощных и плодовых культур (яблоня, груша, слива, вишня и др.)






Среднеазиатский центр: включает территории Ирана, Афганистана, Средней Азии и Северо-Западной Индии. **Это родина: пшеницы, фасоли, гороха, ржи, льна, конопли, лука, чеснока, винограда, дыни, тюльпанов и роз (14%).**

Переднеазиатский центр: территория Малой Азии и Кавказ. **Родина шпината, грецкого ореха, миндаля, пшеницы, ржи, граната, хурмы.**



Средиземноморский центр: включает страны, расположенные по берегам Средиземного моря. Этот центр дал начало 10-11% видов культурных растений. **Среди них такие, как маслины, капуста, спаржа, петрушка, свекла и кормовые травы (клевер и др.)**

Абиссинский центр




Включает территории Эфиопии, части Судана, Сомали и юга Аравийского полуострова.


Здесь много эндемичных растений: нуг, кофейное дерево, особый вид банана, арбуз, твердая пшеница, ячмень, сорго (всего 3-4%)



Центральноамериканский центр: охватывает большую территорию Мексики и Центральной Америки. Из этого центра ведет начало около 8% различных культурных растений, **таких как кукуруза, подсолнечник, хлопчатник, фасоль, тыква, какао, авокадо, табак.**



Южноамериканский центр:
территория западного побережья Южной Америки – Колумбии, Перу и Чили.
Это родина картофеля, томата, арахиса, ананаса, хинного дерева и кокаинового куста.



И. В. Мичурин

- Большой вклад в развитие селекции растений внесли работы И.В. Мичурина.
- Мичурин скрещивал местные морозостойкие сорта с южными, а полученные сеянцы подвергал строгому отбору и содержанию в суровых условиях. Так были получены сорта яблонь **Антоновка, Славянка.**
- Для преодоления нескрещиваемости видов он предложил:
I. Метод предварительных прививок; 2. Метод посредника; 3. Опыление смесью пыльцы.

- **I. Метод предварительных прививок:** изменение химического состава привоя (*рябина на груше* → **опыление** → **гибрид**)
- **2. Метод посредника:** культурный персик + монгольский миндаль → гибрид (посредник) + культурный персик → морозостойкий персик.
- **3. Опыление смесью пыльцы:** пыльцевые трубки с различным генотипом стимулируют друг друга для прорастания и оплодотворения.
- Полученные Мичуриным сорта культурных растений являются гетерозиготными, поэтому для сохранения сортовых качеств, применяют вегетативное размножение – прививками, отводками и черенками.
- Применяя метод гибридизации, И.В. Мичурин получил гибриды **малины и ежевики, рябины и боярышника, терна и сливы.**



Антоновка полуторафунтовая. Получен в виде почковой вариации на одной из ветвей старого сорта Антоновки могилевской белой.

Гибридизация – это получение гибридов от скрещивания генетически разнообразных организмов

Методы гибридизации

1 сорт (порода)

+

2 сорт (порода)



**Новый сорт
(порода)**

Инбридинг

Гетерозис

Полиплоидия

Отдаленная гибридизация

ЦМС (цитоплазматическая мужская стерильность)

Искусственный мутагенез


ИНБРИДИНГ – близкородственное скрещивание, которое приводит к повышению гомозиготности. Применяется для получения **ЧИСТЫХ ЛИНИЙ**.

Часто приводит к снижению общей жизнестойкости из-за накопления вредных рецессивных аллелей.

Единственный метод, используемый для сохранения сорта или породы в чистом виде.



Сорт яблок «Бужбон»



Буденовская порода лошадей

ГЕТЕРОЗИС – (греч. «изменение») гибридная мощь, явление повышенной урожайности, жизнеспособности, высокой плодовитости гибридов первого поколения от скрещивания разных чистых линий. Потомки превышают по этим показателям обоих родителей.

У гибридов второго поколения гетерозисный эффект почти исчезает.

Гетерозис объясняется переходом большинства генов в гетерозиготное состояние, взаимодействием генов.

ПОЛИПЛОИДИЯ – наследственные изменения, связанные с кратным увеличение основного числа хромосом в клетках растений, приводящее к мощному развитию вегетативных органов, плодов, семян и вкусовых качеств.

Иногда встречается в естественных условиях (картофель, табак, томаты).

Большинство культурных растений – полиплоиды.

ОТДАЛЕННАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ –

скрещивание растений и животных разных видов, а иногда и родов.


Полученные таким образом гибриды бесплодны, т. к. хромосомы разных видов негомологичны и не могут конъюгировать при мейозе (не происходит образования гамет).

Применяется для получения высоких и стабильных урожаев растений и продуктивности животных.



ЦМС (ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ)

В 1929 г. генетик М.И. Хаджинов нашел в посевах кукурузы растения с мужской стерильностью и предложил использовать это явление для получения гибридных семян у **обоеполых и самоопыляемых** растений. Стерильность обусловлена взаимодействием особого типа цитоплазмы **S** и генов **rf**.




Внедрение гетерозисных гибридов растений приносит значительный чистый доход производителям продукции с/х

ИСКУССТВЕННЫЙ МУТАГЕНЕЗ

ИМ – искусственное получение мутаций путем воздействия радиационного излучения и химических веществ на семена растений, приводящее к изменению генов.

Таким методом создаются новые сорта томатов, картофеля, кукурузы, хлопчатника, пшеницы.



Очень широко искусственный мутагенез используется в селекции микроорганизмов



Спасибо за внимание!