


СПИД – что это такое?

<u>СПИД</u> –

- синдром приобретенного иммунодефицита;
- первая глобальная эпидемия, которая своими размерами перекрывает все эпидемии, которые перенесло человечество на всем протяжении своего развития;
- Это «Чума XX века».

ВИЧ-

инфекция (вирус иммунодефицита человека)



1979 г. - первые сообщения о заболевших, которыми являлись молодые мужчины - гомосексуалисты.

1983 г. - профессорами Монтанье (Франция) и Галло (США) был открыт вирус.

1984 г. - созданы первые лабораторные системы для выявления заболевания.

Середина 90-х - инфицированные во всех странах мира.

Начало XXI века каждый 200-тый американец стал носителем этого заболевания.



Суть заболевания в том, что вирус, внедряясь в организм, медленно убивает клетки, поддерживающие иммунитет, вызывая полное истощение иммунной системы.

Человаженонет от инфекций: OP3, OPBИ, гриппа, воспаления легких или опухолей лимфатической и кровеносной систем.

Симптомы:

- температура до 37,5 38
- неприятное ощущение в горле, боли при глотании
- красные пятна на коже
- диарея
- увеличение нескольких лимфатических
 узлов на задней стороне шеи, над
 ключицей, иногда на передней стороне
 шеи, под мышками, в паху
- пневмония
- туберкулез
- герпес



Кожные проявления:

- пятна, пузырьки, белесоватый налет, легко
 удаляющийся ватным тампоном
- небольшие пятна буроватого цвета по всей поверхности кожи
- воспаление кожи, когда ее поверхность покрыта отмершими чешуйками
- лишай
- множество «прыщиков» и гнойничков

Пути передачи:

- При внутривенном употреблении наркотиков с использованием общего шприца. Вероятность заражения в результате однократной инъекции 95%.
- При гомосексуальных половых актах
- При обычной половой связи,
 в случае, если один из
 партнеров заражен ВИЧ
 СПИД

- При переливаниях крови.Вероятность 95-96%
- При использовании загрязненных вирусом хирургических, гинекологических инструментов
- При пересадке органов и тканей от больных СПИДом
- От матери к ребенку во время беременности через плаценту и при кормлении грудью через молоко

СПИД не передается:

- через кровососущих насекомых (комаров, и др.)
- через рукопожатия, объятия
- через предметы, одежду, спальные принадлежности, посуду
- плавая в бассейне, отдыхая в сауне, бане
- через поцелуи
- при поездке в общественном транспорте, в местах общепита, больницах и поликлиниках

Последствия СПИДа:



Продолжительность жизни от заражения до момента смерти составляет в среднем от 5 до 8 лет.

При лечении ВИЧ современными противовирусными препаратами пациент может жить много лет, без ухудшения качества жизни.

Если лечение не проводится или оно недостаточно, ВИЧ-инфекция через несколько лет может перейти в СПИД, который вызывает необратимые последствия, приводит к смерти больного.


предотвращение развития СПИДа:

 прохождение профилактического курса лечения беременными женщинами, являющимися носителями заболевания.

<u>Методы</u>: кесарево сечение, искусственное вскармливание младенца

 информационная работа с молодежью, разъяснение о важности использования презерватива для защиты от возможного инфицирования





 необходимо помнить о правилах личной гигиены при пользовании туалетными принадлежностями (ножницы, щипцы, бритвенные станки и т.д.)

• вести здоровый образ жизни

⊙ отказаться от наркотиков, случайных сексуальных связей



СПАСИБО 3А ВНИМАНИЕ!