



СРЕДА ОБИТАНИЯ И ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ПТИЦ

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ К УРОКУ
БИОЛОГИИ 7 КЛАСС
ОТРЯСКИНОЙ Т.А.**

Среды обитания птиц и способы передвижения



водная



воздушная



наземно - воздушная



Классификация птиц



Внешнее строение

- Тело птицы состоит из головы, шеи, туловища, передних и задних конечностей и хвоста. На голове расположены ротовая полость и органы чувств. Челюсти заканчиваются роговыми покровами, образующими клюв.





Внешнее строение птицы

Мандаринка



А. Тело состоит из головы, шеи,

туловища и конечностей.

Б. Голова несет органы чувств.

-имеется клюв (состоит из костных челюстей, покрытых роговым чехлом), зубов нет. форма и величина клюва зависит от потребляемой пищи (на надклювье имеются ноздри).



МЕСТООБИТАНИЕ ПТИЦ



АНТАРКТИДА

(водная среда)



Странствующий
альбатрос

Моря и океаны. На суше
откладывают только яйца.

Пресные воды и морские побережья

Открытые водные пространства



Бурый
пеликан



Большой
фрегат




Кряква
обыкновенная

МЕСТООБИТАНИЕ ПТИЦ

Открытые водные
пространства




Лебедь
черный



Открытые пустынно- степные пространства



Крона деревьев



Большой
пестрый
дятел



Желна
хохлатая

Открытые воздушные пространства



Ласточка
деревенская
(Касатка)



Ласточка
городская
(Воронок)



**Кроме верхнего
и нижнего века
глаза имеют
мигательную
перепонку.**



Зяблик

Короткий
сильный
клюв,
помогает
раскалыват
ь
семена.



Нектарниц

а
Питается
нектаром.
длинный
изогнутый
клюв
проникает
глубоко в
цветок.



Клёст

Клюв
скрещивает
ся
на концах.
используетс
я,
чтобы
доставать
семена



**Цапля
использует
свой
клюв для
ловли
рыбы,
прокалывая
её.**



**Фламинго держит
конец
своего клюва в воде.**



Внешнее строение птицы

В. Шея очень

Поддерживающие конечности превратились в



Соколы имеют
заостренные
крылья,
поэтому они могут
развивать большую



Канюки имеют
большие широкие
крылья,
позволяющие
подниматься вверх
на потоках воздуха.



Внешнее строение птицы

Д. Строение ног зависит от среды обитания:

- Обычно на ногах имеются 4 когтистых пальца.
- Нижняя часть ног(цевка) покрыта роговыми чешуями.



У попугаев два пальца направлены вперед, а два назад



Канадский гусь
Перепончатые лапы



Череп канюка.

Верхняя часть клюва
загибается вниз,
нижняя
часть подвижна, что
позволяет сильно
сжимать добычу.



Ястреб- Перепелятник.

Пока три
передних
когтя
удерживают
добычу –
задний
разрезает её,
как



Внешнее строение птицы

Е. Внешние покровы.

-Кожа сухая. Желез нет.
Исключение копчиковая железа.

- Тело покрыто перьями.

Контурны

е

- стержень

-

очин

-


опахал



Пуховы

е



Контурное маховое перо





Стержень

Бородки I порядка

Бородки II
порядка



Внешнее строение птицы

Контурные перья выполняют разные функции:

- **маховые** (первостепенные и второстепенные) образуют плоскость крыла.
- **рулевые** образуют плоскость хвоста.
- **покровные** придают телу обтекаемую форму (ими одето туловище).



Верхние кроющие перья



Первостепенн
ые


Маховые
перья

Второстепенн

**Первостепенные маховые
перья**



**Верхние кроющие
перья**



Плеч

Предплечье

Крылышко

о

ье

о

Кисть

**Верхние
кроющие
перья**

**Второстепенные
маховые
перья**

**Первостепенные
маховые
перья**



Внешнее строение птицы

- Под контурными перьями лежат пуховые перья – не имеют бородок(пластинок) второго порядка (не образуют второго порядка) стержнем.
- Перьевой покров обеспечивает теплоизоляцию.
- Износившиеся перья заменяются новыми в период сезонных линек
- У большинства видов перья меняются постепенно.

Пуховое

(Не имеют перо бородок второго порядка)



Контурное


(стержень, очин, опахало)





Пу

Перья с коротким стержнем

Строение пера



Бинокулярное зрение



Клюв

В ЖИЗНИ ПТИЦЫ

- Строят гнёзда




Кряква



- чистят перья



- удерживает орудия
для разбивания яиц



- для защиты и угрозы



- добывают, удерживают
пищу



Форма клюва

▼ У колпицы — пинцет с расширенным концом, чтобы ловить беспозвоночных в мутной воде.



У речной утки пластинки в клюве образуют сито для процеживания воды.



У водореза — щипцы для ловли рыбы с воздуха.



▼ У тупика — щипцы для ловли рыбы под водой.



▼ У цапли клюв — гарпун для ловли рыбы сквозь воду.



▼ У шилоклювки — пинцет, чтобы собирать беспозвоночных с поверхности воды.



У фламинго — сито на надклювье.



▼ У баклана — гарпун для ловли рыбы под водой.






Ноги помогают ухаживать
за опереньем




Попугай лапой подносят
пищу ко рту



Некоторые птицы
ногами ловят, умерщвляют и
носят добычу.



Ходьба



Бег



Особенности строения птиц, связанные с их приспособленностью к полёту

- Тело имеет обтекаемую форму, его масса облегчена, благодаря легким и прочным пневматическим костям, утрате зубов, одного яичника и мочевого пузыря.
- Кости различных отделов скелета срослись. Подвижен только шейный отдел.
- Наличие кия увеличивает площадь прикрепления грудных мышц, опускающих крылья.
- Перьевого покрова, обеспечивающий термоизоляцию и способность к маневрированию в полёте.



Список источников



1. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов, 7 класс, Москва, «Дрофа», 2003.
2. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Животные, 7 класс, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2001.
3. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков, 7 класс, С.-Петербург, «Паритет», 2001.
4. Электронный учебник «Открытая Биология», ООО «Физикон», 2002.