

Вопросы лекции

Стебель - ось побега.

Анатомическое строение стебля однодольных и двудольных растений.

**Строение стебля травянистых двудольных растений:
пучковое, непучковое и переходное.**

Строение стебля двудольных и голосеменных древесных растений.

Структура древесины.

Возрастные изменения древесины и коры (ядровая древесина и заболонь).

Конусы нарастания:

I - схемы строения апексов:

а - инициальная клетка одна;

б - группа инициален (туника - корпус Шмидта);


в - группа инициалей (инициальное кольцо и меристема ожидания Плантафоля и Бюва);

1 - инициали;

2 - туника;

3 - корпус;

II - формирование листовых примордиев на конусе нарастания сельдерея (в сканирующем электронном микроскопе)



II

0,5 мм

Схема распределения меристем в стебле:

- 1 - апикальная;
- 2 - интеркалярная;
- 3 - прокамбий;
- 4 - незрелые элементы флоэмы;
- 5 - зрелые элементы флоэмы;
- 6 - незрелые элементы ксилемы;
- 7 - зрелые элементы ксилемы;
- 8 - камбий







Схема развития стебля





**Первичное строение стебля
пролески (поперечный срез):**


- 1 - первичная кора;
- II - центральный цилиндр;
- 1 - эпидерма;
- 2 - колленхима экзодермы;
- 3 - хлоренхима мезодермы;
- 4 - эндодерма - крахмалоносное
влагалище;
- 5 - паренхима перицикла;
- 6 - первичная флоэма;
- 7 - формирующийся камбий;
- 8 - первичная ксилема;
- 9 - паренхима сердцевины

Трихомы

Эмергенцы (шипы малины, розы)

Заложение первичной протоксилемы
в стебле- эндархное, в корне -
экзархное

Формирование проводящего пучка однодольных (вверху) и двудольных (внизу) растений.



Сравнительная характеристика стебля и корня, имеющих первичное строение

Части органа	Корень	Стебли растения	
		однодольного	двудольного
	Э п и б л е м а		Э п и д е р м а
Первичная кора:	Очень сильно развита	Почти не выражена	Достаточно развита
экзодерма	Опробковеваящая паренхима	Ассимиляционная паренхима	Ассимиляционная паренхима и колленхима
мезодерма	Поглощающая паренхима	Ассимиляционная паренхима	
эндодерма	Клетки паренхимы с пятнами Каспари	Клетки паренхимы с зернами крахмала (крахмалоносное влагалище)	
Центральный цилиндр:	Развит слабее первичной коры	Очень сильно развит	Преобладает над первичной корой
перицикл	Меристема, паренхима	Склеренхима	Склеренхима и паренхима
проводящие пучки	Радиальный (расположен в центре)	Закрытые коллатеральные (беспорядочно расположены)	Открытые коллатеральные и биколлатеральные (расположены по кругу)
протоксилема	экзархное	эндархное	
сердцевинные лучи	Не выражены	Основная паренхима	
Сердцевина	То же	Основная паренхима или полость, окруженная основной паренхимой	




Рис. 13. Схема эволюции стелы:

1 — протостела; 2 — актиностела; 3 — плектостела; 4 — эктофлойная сифностела; 5 — артростела; 6 — амфифлойная сифностела; 7 — диктиостела; 8 — эвстела; 9 — атактостела.


Типы стелы и их эволюция: 1 — протостела; 2 — актиностела; 3 — стела корня; 4 — сифностела; 5 — диктиостела; 6 — эвстела; 7 — атактостела; Ксилема — чёрная.




Стелярная теория

Схема строения стебля:

а - двудольных;

б - однодольных





Строение соломины ржи (поперечный срез):

а – схема распределения проводящих пучков; б – строение соломины: 1 – эпидерма; 2 – склеренхима; 3 – хлоренхима коры; 4 – устьице; 5 – паренхима центрального цилиндра; 6 – закрытый коллатеральный сосудисто - волокнистый пучок; 7 – ксилема; 8 – флоэма; 9 - склеренхимная обкладка пучка

Вторичное утолщение у древесных однодольных на примере драцены





Рис. 64. Часть поперечного разреза стебля драцены:

1 — кожица, 2 — пробка, 3 — первичная кора, 4 — проводящие пучки, 5 — деятельное кольцо, 6 — мякоть (паренхима)







Схема формирования стеблей двудольных растений (типы строения):

А - пучковое; Б - непучковое; В - переходное

(а - конус нарастания, б - первичное строение, в - вторичное строение);


1, 2 - флоэма первичная и вторичная; 3 - камбий; 4 - вторичная ксилема;

5 - первичная ксилема




Пучковое строение стебля Клевера лугового – *Trifolium pratense* (поперечный срез):

- 1 – эпидерма;
- 2 – пластинчатая колленхима; 3 – хлоренхима;
- 4 – крахмалоносное влагалище;
- 5 – склеренхима перециклического происхождения;
- 6 – открытый коллатеральный пучок;
- а – флоэма; б – пучковый камбий; в – вторичная ксилема; г – первичная ксилема;
- 7 – межпучковый камбий;
- 8 – одревесневающая склеренхоподобная паренхима;
- 9 – паренхима сердцевины





**Переходное строение стебля.
Петрушка кудрявая, или курчавая
- *Petroselinum crispum*
(поперечный срез):**

- 1 - эпидерма;
- 2 - колленхима;
- 3 - хлоренхима;
- 4 - паренхима;
- 5 - крахмалоносное влагалище;
- 6 - склеренхима перициклического происхождения;
- 7 - одревесневшая паренхима;
- 8 - первичная и вторичная флоэма;
- 9,10 - пучковый камбий;
- 11 - первичная и вторичная ксилема;
- 12 - добавочный пучок из вторичных ксилемы и флоэмы;
- 13 - паренхима сердцевины



**Сплошное строение стебля
льна (поперечный срез):**

- 1 - эпидерма;
- 2 - паренхима;
- 3 - крахмалоносное влагалище;
- 4 - лубяные волокна;
- 5 - флоэма;
- 6 - камбий;
- 7 - вторичная ксилема;
- 8 - первичная ксилема;
- 9 - сердцевина








Строение ствола двудольного древесного растения (поперечный срез трехлетней ветки липы):

- 1 - остатки эпидермы;
 - 2 - перидерма;
 - 3 - колленхима;
 - 4 - паренхима первичной коры;
 - 5 - склеренхима перициклического происхождения;
 - 6 - флоэмная часть первичного сердцевинного луча;
 - 7 - лубяные волокна;
 - 8 - мягкий луб;
 - 9 - камбий;
 - 10 - весенняя древесина;
 - 11 - осенняя древесина;
 - 12 - ксилемная часть первичного сердцевинного луча;
 - 13 - первичная ксилема;
 - 14 - паренхима сердцевины;
- I, II, III - годовичные приросты древесины; А - кора (а' - первичная, а'' - вторичная); Б - древесина; В - сердцевина

**Строение ствола
двудольного
древесного растения
(поперечный срез
двухлетней ветки
яблони):**



- 1 - перидерма;
- 2 - колленхима;
- 3 - паренхима
первичной коры;
- 4 - перициклические и
лубяные волокна;
- 5 - вторичная флоэма;
- 6 - камбий;
- 7 - сердцевинный луч;
- 8 - вторичная ксилема
второго года жизни;
- 9 - вторичная ксилема
первого года жизни;
- 10 - первичная ксилема;
- 11 - паренхима; А - кора
(а' - первичная, а'' -
вторичная); Б -
древесина; В -
сердцевина







Древесина сосны на поперечном срезе:

- 1 - широкопросветные весенние трахеиды с окаймленными порами;
- 2 - граница годичного прироста;
- 3 - узкопросветные осенние трахеиды;
- 4 - смоляной ход;
- 5 - древесная паренхима;
- 6 - сердцевинный луч



Возрастные изменения в стебле древесного растения



Формирование корки и ядра в стволе дерева:

1 - слои пробки; 2 - отмершие ткани коры; 3 - трещины; 4 - кора; 5 - камбий; 6, 7 - древесина (6 - заболонь, 7 - ядро); 8 - сердцевинные лучи

