






Строение хромосом



Определение

- Хромосома - самовоспроизводящийся структурный элемент ядра клетки, содержащий ДНК, в которой заключена генетическая (наследственная) информация. Число, размер и форма хромосом строго определены и специфичны для каждого вида. Каждая хромосома состоит из одной или нескольких пар хромонем. Различают гомологичные и негомологичные хромосомы.




Плечи хроматид

Центромера

Две хроматиды

Теломеры
(концевые участки)



Объемный рисунок строения хромосомы

Краткая характеристика

- Впервые хромосомы были описаны в 80-х гг. 19 в. в виде компактных телец палочковидной формы, выявляемых под микроскопом в ядре на определенной стадии деления клетки.
- Позже оказалось, что Х. постоянно имеются в каждой клетке, однако их внешний вид значительно изменяется на разных стадиях жизни клетки.
- Установлено, что хромосомы представляют собой нитевидную структуру огромной длины (хроматиновая нить), которая может закручиваться, образуя компактную спираль (спирализо-вываться), или раскручиваться (деспи-рализовываться). Плотная спирализация осуществляется перед началом деления клеток и обеспечивает точное перераспределение Х. по дочерним клеткам.
- На стадии митотического деления хромосомы становятся видимыми в световом микроскопе. У них можно заметить участок, называемый центромерой, к которому прикрепляются особые нити (нити веретена), участвующие в «растягивании» хромосом во время деления клеток.
- Центромера располагается в центре Х., деля ее на два равных плеча, или же может сдвигаться к одному из концов. В последнем случае говорят, что данная Х. неравноплечая.
- Как показывают последние достижения молекулярной генетики, хромосома представляет собой фактически одну длинную хроматиновую нить, образованную гигантской молекулой ДНК



Хромосомы клетки человека
непосредственно перед делением ядра
(увеличение в 950 раз). Хорошо
заметно, что пары хромосом всё ещё
связаны между собой центромерами

Число хромосом у разных видов

- Число хромосом во всех клетках каждого вида организмов строго постоянно и является точной характеристикой данного вида.

Вид	$2n$
Человек (<i>Homo sapiens</i>)	46
Горилла	48
Макака (<i>Macaca mulatta</i>)	42

• Животные		• Растения	
• Кошка (<i>Felis domesticus</i>)	38	• Клевер	14
• Собака (<i>Canis familiaris</i>)	78	• Тополь	38
• Лошадь	64	• Кукуруза (<i>Zea mays</i>)	20
• Корова (<i>Bovis domesticus</i>)	120	• Горох	14
• Курица (<i>Gallus domesticus</i>)	78	• Береза	84
• Свинья	40	• Ель	24
• Плодовая мушка (<i>D.melanogaster</i>)	8	• Лук (<i>Allium cepa</i>)	16
• Мыши (<i>Mus musculus</i>)	40	• Арабидопсис (<i>Arabidopsis thaliana</i>)	10
• Дрожжи (<i>S.cerevisiae</i>)	32	• Картофель (<i>S.tuberosum</i>)	48
• Нематода	22/24	• Лилия	24
• Крыса	42	• Хвощ полевой	216
• Лиса	34	• Томат	24
• Голубь	16	• Крыжовник	16
• Карп	104	• Вишня	32
• Минога	174	• Рожь	14
• Лягушка (<i>Rana pipiens</i>)	26	• Пшеница	42
• Миксомицеты	14	• Папоротник	~1200
• Бабочка	380	• Липа сердцевидная	78
• Шелкопряд	56	• Ирис русский	80
• Протей (<i>Necturus maculosus</i>)	38	• Гладиолус обыкновенный	80
• Рак (<i>Cambarus clarkii</i>)	200	• Клевер паннонский	84
• Гидра	30	• Полушник озерный	90-180
• Аскарида	2	• Крупка альпийская	96-180
• Пчела	16	• Листовик японский	104
• Муравей (<i>Mutmeicia pilosula</i>)	2	• Щитовник мужской	110
• Виноградная улитка	24	• Баранец обыкновенный	144
• Земляной червь	36	• Ужовник обыкновенный	164
• Речной рак	1 16	• Гаплопаппус	4
• Малый плазмодий	2	• Арабидопсис Таля	6
• Радиолярия	1600		





- Наименьшее число хромосом: самки подвида муровьев *Myrmecia pilosula* имеют пару хромосом на клетку. Самцы имеют только 1 хрососому в каждой клетке.
- Наибольшее число: вид папоротников *Ophioglossum reticulatum* имеет около 630 пар хромосом, или 1260 хромосом на клетку
- Верхний предел числа хромосом не зависит от количества ДНК которое в них входит: у американской амфибии *Amphiuma* ДНК в ~30 раз больше, чем у человека, которая помещается в 14 хромосомах. Самая маленькая хромосома амфибии больше самых крупных хромосом человека --> большое количество ДНК может не влиять на увеличение числа хромосом.
- Существует минимальная масса хромосомы необходимая для расхождения хромосом в митозе - критическая масса. Наличие такой массы может частично объяснить избыточность ДНК.

Бактериальные хромосомы

- Прокариоты (архебактерии и бактерии, в том числе митохондрии и пластиды, постоянно обитающие в клетках большинства эукариот) не имеют хромосом в собственном смысле этого слова.
- У большинства из них в клетке имеется только одна макромолекула ДНК, замкнутая в кольцо (эта структура получила название нуклеоид). У ряда бактерий обнаружены линейные макромолекулы ДНК. Помимо нуклеоида или линейных макромолекул, ДНК может присутствовать в цитоплазме прокариотных клеток в виде небольших замкнутых в кольцо молекул ДНК, так называемых плазмид, содержащих обычно незначительное, по сравнению с бактериальной хромосомой, число генов. Состав плазмид может быть непостоянен, бактерии могут обмениваться плазмидами в ходе парасексуального процесса.
- Имеются данные о наличии у бактерий белков, связанных с ДНК нуклеоида, но гистонов у них не обнаружено.

Хромосомы эукариот

- Хромосомы эукариот имеют сложное строение. Основу хромосомы составляет линейная макромолекула ДНК (в молекулах ДНК хромосом человека насчитывается от 50 до 245 миллионов пар азотистых оснований). В растянутом виде длина хромосомы человека может достигать 5 см. Помимо неё, в состав хромосомы входят пять специализированных белков гистонов — Н1, Н2А, Н2В, Н3 и Н4 и ряд негистоновых белков.
- В интерфазе хроматин не конденсирован, но и в это время его нити представляют собой комплекс из ДНК и белков. Макромолекула ДНК обвивает октомеры (структуры, состоящую из восьми белковых глобул) гистоновых белков Н2А, Н2В, Н3 и Н4, образуя структуры, нуклеосомную нитью, $d=10$ нм.
- В ранней интерфазе (фаза G1) основу каждой из будущих хромосом составляет одна молекула ДНК. В фазе синтеза (S) молекулы ДНК вступают в процесс репликации и удваиваются. В поздней интерфазе (фаза G2) основа каждой из хромосом состоит из двух идентичных молекул ДНК, образовавшихся в результате репликации и соединённых между собой в районе центромерной последовательности.
- Перед началом деления клеточного ядра хромосома, представленная на этот момент цепочкой нуклеосом, начинает спирализовываться, или упаковываться, образуя при помощи белка Н1 более толстую хроматиновую нить, или хроматиду, $d=30$ нм. В результате дальнейшей спирализации диаметр хроматиды достигает ко времени метафазы 700 нм. Конденсированная хромосома имеет вид буквы X (часто с неравными плечами), поскольку две хроматиды, возникшие в результате репликации, по-прежнему соединены между собой в районе центромеры (подробнее о судьбе хромосом при клеточном делении см. статьи митоз и мейоз).










Рис. 3. Схема мейотического деления, в ходе которого первичные зародышевые клетки дифференцируются в зрелые половые клетки.



Хромосомы X и Y, определяющие пол человека.



Мужской хромосомный набор диплоидной (обычной) клетки
Обратите внимание! Присутствует как X, так и Y-хромосома



Женский хромосомный набор диплоидной (обычной) клетки
Обратите внимание! Присутствуют только Х-хромосомы

Типы строения хромосом


- Различают четыре типа строения хромосом:
 1. телоцентрические (палочковидные хромосомы с центромерой, расположенной на проксимальном конце);
 2. акроцентрические (палочковидные хромосомы с очень коротким, почти незаметным вторым плечом);
 3. субметацентрические (с плечами неравной длины, напоминающие по форме букву L);
 4. метацентрические (V-образные хромосомы, обладающие плечами равной длины).
- Тип хромосом является постоянным для каждой гомологичной хромосомы и может быть постоянным у всех представителей одного вида или рода.

- 1 - равноплечие
(метацентрические);
2 - неравноплечие
(субметацентрические);
3 - палочковидные
(акроцентрические);
4 - хромосомы с вторичной
перетяжкой.






Гигантские хромосомы

- Для них характерны огромные размеры, можно наблюдать в некоторых клетках на определённых стадиях клеточного цикла. Например, они обнаружаются в клетках некоторых тканей личинок двукрылых насекомых (политенные хромосомы) и в ооцитах различных позвоночных и беспозвоночных (хромосомы типа ламповых щёток). Именно на препаратах гигантских хромосом удалось выявить признаки активности генов.
- **Политенные хромосомы**
- Впервые обнаружены Бальбиани в 1881-го, однако их цитогенетическая роль была выявлена Костовым, Пайнтером, Гейтцем и Бауером. Содержатся в клетках слюнных желёз, кишечника, трахеи, жирового тела и мальпигиевых сосудов личинок двукрылых.
- **Хромосомы типа ламповых щёток**
- Обнаружены Рюккертом в 1892 году. По длине превышают политенные хромосомы, наблюдаются в ооцитах на стадии первого деления мейоза, во время которой процессы синтеза, приводящие к образованию желтка, наиболее интенсивны. Общая длина хромосомного набора в ооцитах некоторых хвостатых амфибий достигает 5900 мкм.



Микрофотография политеческих хромосом слюнной железы *Drosophila melanogaster*



Схемы хромосом типа
“ламповых щеток”

Хромосомные перестройки

- Нарушение структуры хромосом происходит в результате спонтанных или спровоцированных изменений (например, после облучения).
- Генные (точковые) мутации (изменения на молекулярном уровне);
- Аберрации (микроскопические изменения, различимые при помощи светового микроскопа):
 1. делеции
 2. дупликации
 3. транслокации
 4. инверсии

Делеция

- Делеция (от лат. *deletio* — уничтожение) — хромосомная аберрация (перестройка), при которой происходит потеря участка хромосомы. Делеция может быть следствием разрыва хромосомы или результатом неравного кроссинговера. Делеции подразделяют на интерстициальные (потеря внутреннего участка) и терминальные (потеря концевого участка).
- Делеция гена отвечающего за белок CCR5-дельта32 приводит к невосприимчивости её носителя к ВИЧ. Предполагается, что эта мутация возникла примерно две с половиной тысячи лет назад и, со временем, распространилась по Европе.





Схема иллюстрирующая принцип деления.

Дупликация

- Дупликация (лат. *duplicatio* — удвоение) — структурная хромосомная мутация, заключающаяся в удвоении участка хромосомы.





Схема иллюстрирующая принцип дупликации

Транслокация


- Транслокация — тип хромосомных мутаций. В ходе транслокации происходит обмен участками негомологичных хромосом, но общее число генов не изменяется. Различные транслокации приводят к развитию лимфом, сарком, заболеванию лейкемией, шизофренией.



Транслокация, обмен участков 4 и 20 хромосом

Инверсии

- Инверсии — хромосомные перестройки, связанные с поворотом отдельных участков хромосомы на 180°.
- Инверсии бывают пара- и periцентрическими.
- В случае парацентрической инверсии происходят два разрыва хромосом, оба по одну сторону от центромеры. Участок между точками разрыва поворачивается на 180°.
- При periцентрической инверсии точки разрыва расположены по обе стороны от центромеры.




Схемы хромосомных перестроек (аберрации хромосом): 1 — транслокация; 2 — инверсия; 3 — крупная исхвата

Формирование хромосомной теории

- В 1902-1903 гг. американский цитолог У. Сеттон и немецкий цитолог и эмбриолог Т. Бовери независимо друг от друга выявили параллелизм в поведении генов и хромосом в ходе формирования гамет и оплодотворения. Эти наблюдения послужили основой для предположения, что гены расположены в хромосомах. Однако экспериментальное доказательство локализации конкретных генов в конкретных хромосомах было получено только в 1910 г. американским генетиком Т. Морганом, который в последующие годы (1911—1926) обосновал хромосомную теорию наследственности. Согласно этой теории, передача наследственной информации связана с хромосомами, в которых линейно, в определенной последовательности, локализованы гены. Таким образом, именно хромосомы представляют собой материальную основу наследственности.
- Формированию хромосомной теории способствовали данные, полученные при изучении генетики пола, когда были установлены различия в наборе хромосом у организмов различных полов.

Хромосомная теория наследственности

Теория, согласно которой хромосомы, заключённые в ядре клетки, являются носителями генов и представляют собой материальную основу наследственности, то есть преемственность свойств организмов в ряду поколений определяется преемственностью их хромосом. Хромосомная теория наследственности возникла в начале 20 в. на основе клеточной теории и использования для изучения наследственных свойств организмов гибридологического анализа.



Наследование сцепленных признаков у дрозофилы: а—полное сцепление (дигетерозигртен самец, у которого отсутствует кроссинговер); б — сцепление с кроссинговером {дигетерозигатт самка, у которой кроссинговер не подавлен}; b+, b- ~ серая и черная окраски тела; vg+, vg- — нормальные и зачаточные крылья соответственно.