

Тема:
Тип Круглые черви
(Nemathelminthes)

Задачи:

Изучить характеристику типа,
особенности строения и биологию
представителей

Общая характеристика типа



Тип Круглые черви объединяет животных, имеющие круглое в поперечном сечении тело, часто оно нитевидно вытянуто. В настоящее время известно более 100 тыс. видов круглых червей, обитающих на дне морей, в пресных водоемах, почве, а также ведущих паразитический образ жизни.

Тип делится на несколько классов, наиболее многочисленный среди них класс Нематоды.

Внешнее строение. Форма тела веретеновидная или нитевидная, круглая в поперечном сечении. Тело цельное, несегментированное, снаружи покрыто кутикулой.


Общая характеристика типа



Полость тела. Внутри кожно-мускульного мешка развивается **первичная полость тела, схизоцель**, которая соответствует первичной полости зародыша – **бластоцели**. Межклеточная жидкость замещает паренхиму. Внутренние органы находятся в этой первичной полости тела.

Пищеварительная система состоит из трех отделов: передний, средний и задний отделы кишечника. Передний отдел и задняя кишка имеют эктодермальное происхождение, а средний отдел — энтодермального. **Появляется анальное отверстие и пища начинает двигаться в одном направлении.**

Общая характеристика типа



Выделительная система представлена гиподермальными (кожными) одноклеточными железами и "шейными железами".

Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца, окружающего глотку, и отходящих вперед и назад 6 нервных стволов, из которых спинной и брюшной развиты наиболее сильно.

Размножение.


Преимущественно раздельнополые организмы, развитие прямое.

Общая характеристика типа

Появление круглых червей сопровождалось следующими ароморфозами:

1. Образовалась первичная полость, схизоцель, которая сформировалась путем замещения паренхимы жидкостью. Жидкость находится под большим давлением и является гидроскелетом, выполняя опорную функцию; участвует в обмене веществ внутри организма, транспортируя различные вещества;
2. Появилась задняя кишка и заднепроходное отверстие, что позволило сделать процесс пищеварения поэтапным;
3. Произошла дальнейшая концентрация нервных клеток, образуется 6 нервных стволов и формируется окологлоточное нервное кольцо;
4. Произошло разделение полов, что обеспечило комбинативную изменчивость и генетическое разнообразие потомков.


Строение и жизнедеятельность нематод



Форма тела и кожно-мускульный мешок. Тело цельное, несегментированное, веретеновидное или нитевидное, круглое в поперечном сечении, снаружи покрыто кутикулой. Кутикула обычно достигает большой толщины и прочности, во время роста червей она периодически сбрасывается, затем возобновляется.

Под кутикулой находится **гиподерма**, которая представляет собой продукт слияния клеток.


Строение и жизнедеятельность нематод



Под гиподермой расположены продольные мышцы, разделенные валиками гиподермы на 4 ленты. При сокращении спинные и брюшные ленты действуют как антагонисты.

Внутри кожно-мускульного мешка имеется *первичная полость (схизоцель)*, она не имеет собственной мезодермальной выстилки, и в ней находятся внутренние органы тела. Полость заполнена жидкостью, которая находится под давлением и играет роль «гидроскелета».

Строение и жизнедеятельность нематод




Пищеварительная система начинается на переднем конце тела ротовым отверстием, которое окружено губами. Состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Передний отдел обычно разделяется на ротовую полость, глотку и пищевод. Пищеварение происходит в средней части кишки. Задняя кишка заканчивается анальным отверстием.

Органы дыхания отсутствуют. У свободноживущих и паразитов растений газообмен происходит через покровы тела. У паразитов животных дыхание анаэробное.

Кровеносная система отсутствует, транспортную функцию выполняет полостная жидкость.


Строение и жизнедеятельность нематод



Выделительная система своеобразна. Имеется шейная железа, представленная одной или двумя секреторными клеткой, расположенной снизу передней части тела. От них отходят один или два канала, проходящие в боковых валиках гиподермы. Сзади они слепо замкнуты, спереди соединяются в выводной проток, открывающийся выделительной порой.

На стенках выделительных каналов в передней части тела находятся четыре крупные фагоцитарные клетки. Они захватывают и накапливают в цитоплазме остаточные продукты обмена.

Строение и жизнедеятельность нематод




Выделительная система

своеобразна. Имеется шейная железа, представленная одной или двумя секреторными клеткой, расположенной снизу передней части тела. От них отходят один или два канала, проходящие в боковых валиках гиподермы. Сзади они слепо замкнуты, спереди соединяются в выводной проток, открывающийся выделительной порой.

На стенках выделительных каналов в передней части тела находятся четыре крупные фагоцитарные клетки. Они захватывают и накапливают в цитоплазме остаточные продукты обмена.


Строение и жизнедеятельность нематод



Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца, окружающего глотку и пищевод и отходящих вперед и назад 6 нервных стволов, из которых спинной и брюшной наиболее развиты.

Нервная система образована небольшим числом нервных клеток, что свидетельствует о ее примитивности (у аскариды, например, нервная система состоит из 162 клеток). Органы чувств развиты слабо. Имеются органы осязания, органы химического чувства.


Строение и жизнедеятельность нематод



Органы размножения имеют трубчатое строение. Мужские половые органы имеют форму непарной трубки, тонкая часть которой является семенником, средняя часть — семяпроводом, наиболее толстый отдел — семяизвергательным каналом, открывающимся в конечный отдел кишечника — **клоаку**.

У самки парные **яичники** продолжают в **яйцеводы**, которые, расширяясь, переходят в **две матки**, открывающиеся в **непарное влагалище**, заканчивающееся половым отверстием на брюшной стороне тела. Оплодотворение яиц происходит в матке.


Паразитические нематоды



Аскарида человеческая (*Ascaris lumbricoides*), паразитирует в тонком кишечнике. Это крупный гельминт: самки — до 40 см, самцы — до 25 см.

У самок задний конец прямой, у самцов — заострен и загнут на брюшную сторону. Самка аскариды откладывает более 200 000 яиц в сутки. Яйцам аскариды нужно попасть во внешнюю среду, для развития личинок внутри яйца необходим кислород, определенная влажность, достаточно высокая температура.

Паразитические нематоды



Яйца покрыты несколькими защитными оболочками и способны сохранять жизнеспособность до 10 лет. При благоприятных условиях в течение 15 — 20 суток в яйце формируется личинка.

Такое яйцо называется *инвазионным*. Заражение людей происходит при употреблении овощей и фруктов, загрязненных яйцами аскариды. Развитие аскариды происходит без смены хозяев. В тонком кишечнике личинки освобождаются от оболочки, пробивают упругим телом слизистую кишечника и попадают в кровь.

Паразитические нематоды



Рис. 30. Легкое мыши через 7 дней после заражения зрелыми яйцами *Ascaris lumbricoides*. Увеличено в 10 раз. Препарат Е. С. Лейкиной.

С током крови они попадают в **сердце**, а оттуда — в **легкие**. В альвеолах легких они некоторое время находятся в среде, богатой кислородом.

Из легочной ткани они проникают в **bronхи**, из них — в **трахею**, а затем — в **глотку** и вторично проглатываются.

Миграция личинок продолжается 9 — 12 суток. За это время личинки растут, несколько раз линяют. Попав **вторично в кишечник**, личинки в течение 3 месяцев растут и превращаются в половозрелых особей. Продолжительность жизни аскарид около 1 года.

Паразитические нематоды



Аскарида — опасный паразит человека. Она отравляет организм человека ядовитыми продуктами своего метаболизма и, проникая в различные органы и полости, механически повреждает их. Большое их количество может вызвать закупорку кишечника.




Паразитические нематоды



К круглым червям относят также **человеческую острицу (*Enterobius vermicularis*)**, паразитирующую в нижних отделах тонкого и в толстом кишечнике.

Взрослые черви имеют небольшие размеры, самки — до 12 мм, самцы — до 5 мм. Самки откладывают яйца на коже около анального отверстия, вызывая зуд. Оказавшись под ногтями, яйца легко могут попасть в рот ребенка. **Инвазионными они становятся уже через 4 — 6 часов.** В тонком кишечнике из них выходят личинки, которые мигрируют в начальные отделы толстого кишечника и через 2 недели достигают половой зрелости.

Паразитические нематоды



Ришта – опасный паразит человека, образующий подкожные нарывы. Достигает в длину до 1 м. Личинка должна попасть в воду, где проникает в **промежуточного хозяина – циклопа**. Заражение человека происходит при питье сырой воды, содержащей зараженных циклопов.

Нитчатка Банкрофта вызывает у человека «слоновью болезнь», паразитируя в лимфатических сосудах и закупоривая их, они препятствуют оттоку лимфы.

Паразитические нематоды


Среди паразитов растений наиболее известны **свекловичная, луковая, картофельная, пшеничная и другие нематоды**. Они угнетают рост, снижают урожайность сельскохозяйственных культур, а в случае их сильного поражения вызывают и их гибель.



Большой вклад в развитие паразитологии внес академик **К. И. Скрябин**, под руководством которого изучался видовой состав, биология паразитических червей, были разработаны санитарные мероприятия по ликвидации наиболее опасных глистных заболеваний.

К ним относятся **очистка воды, ветеринарно-санитарный контроль за качеством мяса, очистка населенных пунктов, недопущение использования в качестве удобрений необезвреженных фекалий**. Большой положительный эффект дают систематические медосмотры, особенно в детских учреждениях. Ведется большая разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

Повторение




Что обозначено на рисунке цифрами 1 - 10?

Важнейшие термины и понятия:

1. Первичная полость тела, схизоцель, псевдоцель. 2. Шейная железа. 3. Фагоцитарные клетки. 4. Клоака. 5. Инвазионные яйца. 6. Гиподерма.

Повторение



Что обозначено
на рисунке
цифрами 1 - 16?

Повторение

1. Для круглых червей характерна () полость тела.
2. Снаружи тело круглых червей покрыто ().
3. В пищеварительной системе впервые появляется ().
4. В настоящее время насчитывается около () видов различных нематод.
5. Жидкость первичной полости тела выполняет ряд функций: ().
6. Выделительная система представлена ().
7. Нервная система образована (), соединенными кольцевыми перемычками.
8. Половая система самки образована парными (), двурогой () и непарным ().
9. Яйца аскариды становятся инвазионными через ().
10. Личинки аскариды в организме человека из выходят из кишечника и совершают миграцию по следующим органам: ().
11. Яйца остриц становятся инвазионными ().
12. Острицы паразитируют у человека в ().
13. Заражение аскаридами и острицами происходит ().
14. Большой вклад в развитие паразитологии внес выдающий русский гельминтолог ().