

Тип плоские черви

Многообразие плоских червей
Выполнила учитель биологии
Пискунова О.А.
МОУ СОШ №3



Тип Плоские черви

Многообразиие плоских червей

Тип плоские черви

Класс турбеллярии (ресничные черви)


представитель: **Белая планария**




различные виды планарий





планария дугезия, глазчатая филлидия, подражающий псевдоцерос, золотистая юнгия. Нижний ряд, слева направо: псевдоцерус джебборум, раздвоенный псевдоцерос (в паре с партнером), тихоокеанская акваплана, парапланоцера



Расположение мышц у белой планарии



Двусторонняя и
лучевая
симметрия тела.



***Ткани
планарии***

Покровная

Мышечная

Нервная

Соединительная

Внутреннее строение

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ПЛОСКОГО ЧЕРВЯ

XIV - 1


НЕРВНАЯ СИСТЕМА

КОНТУР ТЕЛА

XIV - 2

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

XIV - 3





XIV - 4

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

XIV - 5

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Пищеварительная система




Плоские черви
Планария


Пищеварительный
тракт

Глотка

Рот




Нервная система




Выделительная система планарии:



ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ
ПЛАНАРИЯ



Регенерация тела планарии:




- Один из видов плоских червей планария способна полностью регенерировать новую особь из любого участка своего тела. Как показано на рисунке, планарии свойственна переднезадняя полярность, т.е. голова всегда развивается у нее на переднем конце фрагмента тела.

Тип плоские черви
Класс Трематоды (сосальщики)
представитель: Печеночный
сосальщик



Цикл развития печеночного сосальщика




Цикл развития печеночного сосальщика



Цикл развития печеночного сосальщика

1. Взрослый паразит в теле коровы
2. Яйца печеночного сосальщика
3. Свободноплавающая личинка
4. Развитие в теле малого прудовика
5. Личинка с хвостом
6. Циста





Заражение

- **Источником заражения является человек. Наибольшую опасность представляют лица, ухаживающие за животными (пастухи, доярки). Возможно участие мух в передаче возбудителя. Яйца цепня бычьего устойчивы во внешней среде, сохраняя жизнеспособность под снегом в течение зимы. Высыхание, высокая температура (выше +30С) и низкая (ниже -30С) температура действуют губительно.**

Человек заражается при употреблении в пищу сырого, полусырого, малосоленого и вяленого мяса, содержащего личинки цепня (финны).

Внешнее строение бычьего цепня



Внутреннее строение

1. *Нервная система: развита слабо*
2. *Пищеварительная система: всасывает всей поверхностью тела содержимое кишечника организма-хозяина*
3. *Кровеносная система: отсутствует*
4. *Выделительная система: протонефридии*
5. *Репродуктивная система: гермафродитная*

- **Взрослый бычий цепень паразитирует в кишечнике человека. Зрелые членики, содержащие яйца, отрываются и с фекалиями поступают наружу. Там они могут попасть на траву, которую поедают коровы. В желудке коровы из яиц выходят личинки, снабженные шестью крючками. Они выбуравливаются в стенку кишечника и с током крови разносятся ко всем органам. Там они превращаются в финну. В тканях финна вырастает до размеров горошины. Человек заражается яйцами бычьего цепня употребляя в пищу зараженное финнами, плохо прожаренное мясо коровы. В кишечнике из финны выходит цепень, имеющий вид головки с шейкой, от которой начинают нарастать новые членики. Длина взрослого цепня может достигать нескольких метров.**

Цикл развития бычьего цепня

- *Взрослый паразит в теле человека*
- *Членики с яйцами бычьего цепня*
- *. Корова с личинками*
- *Личинка с хитиновыми крючьями*
- *Финна в мышцах коровы*

Цикл развития бычьего цепня

