


тrophicеские цели





Внутри экологической системы органические вещества создаются **автотрофными организмами** (например, растениями). Растения поедают животные, которых, в свою очередь, поедают другие животные. Такая последовательность называется ***пищевой цепью***; каждое звено пищевой цепи называется ***трофическим уровнем*** (греч. *trophos* «питание

Тепловая энергия, теряющаяся при дыхании



Трофические цепи


Детритные
цепи

разложени

я

Пастбищн
ые цепи

Солнце



ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ

**Первичные
продуценты**



**Зеленые
растения**

**Потребители
1го порядка**



**Растительноядные
животные**

**Потребители
2го порядка**



**Потребители
3го порядка**



Хищники


**Потребители
4го порядка**




Пример трофической цепи




Сок
растения



тля



Божья
коровка
а




паук






Насекомоядная
птица

- Существует ещё одна группа организмов, называемых *редуцентами*. Это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), питающиеся органическими остатками мёртвых растений и животных (*детритом*).
- Детритом могут также питаться животные – *детритофаги*, ускоряя процесс разложения остатков. Детритофагов, в свою очередь, могут поедать хищники. В отличие от пастищных пищевых цепей, начинающихся с первичных продуцентов (то есть с живого органического вещества), детритные пищевые цепи начинаются с детрита (то есть с мёртвой органики).



Тела погибших растений и животных еще содержат энергию и "строительный материал", так же как и прижизненные выделения, например, моча и фекалии. Эти органические материалы разлагаются микроорганизмами, а именно грибами и бактериями, живущими как сапрофиты на органических остатках.. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются за несколько недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины (и других растительных остатков) играют грибы, которые выделяют фермент целлюлазу, размягчающий древесину, и это дает возможность мелким животным проникать внутрь и поглощать размягченный материал.

Приведем две типичные детритные пищевые цепи наших лесов:







Однако на самом деле пищевые связи в экосистеме много сложнее, потому что животное может питаться организмами разных видов, которые к тому же могут находиться на разных трофических уровнях экосистемы

. Например, для совы не имеет значения, поедает ли она растительноядных полевок или питающихся насекомыми землероек (та и другая добыча представляет одинаковую пищевую ценность, а поимка зверьков требует одинаковых усилий).

Поэтому пищевые цепи переплетаются сложным образом, так что получается сеть .Пример пищевой (трофической) сети : лесная экосистема.




Взаимоотношения между различными организмами в лесу, формирующие пищевую сеть



- В сапрофитных (сапрофиты – организмы (животные, грибы, бактерии), питающиеся органическим веществом отмерших организмов) пищевых цепях, в которых движение материи имеет тенденцию к разрушению, существенную роль играют лиственные леса, большая часть листьев которых не употребляется в пищу травоядными и входит в состав подстилки из опавших листьев. Эти листья измельчаются многочисленными животными сапрофагами, потом заглатываются земляными червями, которые осуществляют равномерное распределение гумуса в поверхностном слое земли. На этом уровне у грибов закладывается мицелий, а разлагающие микроорганизмы, завершающие цепь, производят окончательную минерализацию мертвый органики.


- Пищевые сети служат основой для построения **экологических пирамид**. Простейшими из них являются **пирамиды численности**, которые отражают количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом уровне. Для удобства анализа эти количества отображаются прямоугольниками, длина которых пропорциональна количеству организмов, обитающих в изучаемой экосистеме, либо логарифму этого количества. Часто пирамиды численности строят в расчёте на единицу площади (в наземных экосистемах) или объёма (в водных экосистемах).


- Организмы первого трофического уровня называются *первичными продуцентами*. На суше большую часть продуцентов составляют растения лесов и лугов; в воде это, в основном, зелёные водоросли. Кроме того, производить органические вещества могут синезелёные водоросли и некоторые бактерии



- Организмы второго трофического уровня называются *первичными консументами*, третьего трофического уровня – *вторичными консументами* и т. д.
- Первичные консументы – это травоядные животные (многие насекомые, птицы и звери на суше, моллюски и ракообразные в воде) и паразиты растений (например, паразитирующие грибы).
- Вторичные консументы – это плотоядные организмы: хищники либо паразиты.
- В типичных пищевых цепях хищники оказываются крупнее на каждом уровне, а паразиты – мельче.

- Трофический уровень
- **Trophic level**
- Трофический уровень - совокупность организмов, объединенных типом питания. Различают пять трофических уровней:
 - 1- продуценты;
 - 2- первичные консументы (растительноядные организмы);
 - 3- вторичные консументы (хищники) и паразиты первичных консументов;
 - 4- вторичные хищники, нападающие на других хищников, и паразиты вторичных консументов;
 - 5- надпаразиты высоких порядков.





задание:
постройте пищевую сеть,
включив в нее травы, кролика,
почвенные грибы,
ягодный кустарник
(например, смородину) и волка.

Второй вариант:
жук-навозник,
растительноядное насекомое
(гусеница),
паук, воробей, ястреб