

Цветковые, или покрытосеменные



Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta)



Общая характеристика

Самый крупный отдел высших растений: более 13000 родов и свыше 250000 видов. Типовой род – [магнолия](#) (*Magnolia*, фото).

Особенности жизненного цикла:

чередование поколений с доминированием бесполого поколения (спорофита).

Распространение семенами и нередко [плодами](#).

[Магнолия крупноцветковая](#) (*Magnolia grandiflora*)

Плод – [замкнутый плодолистик](#) (мегаспорофилл) – обеспечивает дополнительную защиту и питание семян. Плод формируется при созревании [цветка](#).

Цветок – уникальная морфологическая структура, возникшая на основе обоеполого стробиля голосеменных типа беннеттиевых (согласно [эуантовой гипотезе](#) возникновения цветка).

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta)



Общая характеристика отдела

Гаметофиты. Женский представлен зародышевым мешком, мужской – зрелым пыльцевым зерном. Они крайне упрощены и развиваются значительно быстрее, чем у голосеменных. Полностью утратили гаметангии (архегонии и антеридии).

Для цветковых растений характерно **двойное оплодотворение**, что резко отличает их от остальных групп растений.

Значение двойного оплодотворения. Установлено русским ученым Сергеем Гавриловичем Навашиным (фото) в 1898 г. Им было показано, что один спермий сливаются с яйцеклеткой, а второй – с диплоидным центральным ядром зародышевого мешка. В результате образуется вторичный **триплоидный эндосperm**. Несомненное преимущество двойного оплодотворения – очень быстрое образование питательной ткани, которое происходит только после оплодотворения яйцеклетки. Семяпочки цветковых, не обремененные запасанием питательной ткани впрок, развиваются гораздо быстрее, чем у голосеменных.

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta)




Рис. 28. Схема развития мужского гаметофита (A) и женского гаметофита (зародышевого мешка) *Polygonum*-типа (Б):

1 — микроспора, или материнская клетка, пыльцевого зерна; 2 — двухклеточное пыльцевое зерно, клетка-трубка и генеративная клетка; 3 — деление генеративной клетки; 4 — трехклеточное пыльцевое зерно (спермии-клетки свободно лежат в цитоплазме клетки-трубки); 5 — прорастание пыльцевого зерна; 6 — мегаспора; 7—8 — первое деление ядра мегаспоры; 9 — второе деление, четырехъядерная стадия развития женского гаметофита; 10 — третье деление, восьмиядерная стадия; 11 — зрелый семиклеточный женский гаметофит (в нем различаются яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух синергид, центральная клетка с двумя полярными ядрами и три антиподы); 12 — двойное оплодотворение (слияние спермиев с ядром яйцеклетки и с объединившимися ядрами центральной клетки). Одна из синергид дегенерирует (заштрихована), в ней видны остатки содержимого пыльцевой трубки.

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta)



Foto: Anna-Lena Anderberg

Общая характеристика отдела (продолжение)

Происхождение: вероятно [от семенных папоротников](#), но нет очевидных доказательств. Наиболее правдоподобно неотеническое происхождение цветковых растений (достижение половозрелого состояния на более ранней стадии развития), в особенности возникновение цветка, а также женского и мужского гаметофитов. Цветковые могли возникнуть в результате экологического стресса в условиях временной сухости муссонного климата на открытых горных склонах. Первоначально, по-видимому, были представлены древесными растениями с вечнозелеными листьями и обоеполыми соцветиями.

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta)



Эволюция цветковых растений шла по пути широкой [адаптивной радиации](#) очень [быстрыми темпами](#). Древнейшие ископаемые остатки цветковых растений относятся к раннему мелу (125 млн лет назад). Благодаря высокой эволюционной пластичности они уже через 15 млн лет распространились по всему земному шару. Большую роль в эволюции цветковых растений сыграли [насекомые-опылители](#).

Значение в наземных экосистемах. Цветковые растения – единственная группа растений, образующая сложные [многоярусные сообщества](#) (фото), что способствовало интенсивному использованию окружающей среды, более успешному завоеванию новых территорий и освоению новых мест обитаний.

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta)

Цветковые растения подразделяются на два класса: [однодольные](#) и [двудольные](#).

Кубышка желтая (*Nuphar luteum*)

Foto: Torbjörn Kronestedt

Однодольные растения произошли от примитивных двудольных, которые характеризовались бессосудистой ксилемой, апокарпным гинецеем и однобороздными пыльцевыми зернами. Из современных двудольных наибольшим числом общих признаков с однодольными обладают представители порядка [кувшинковые](#).

Кувшинка белая (*Nymphaea alba*)




Foto: Arne Anderberg

Однодольные растения

1. Семядоля одна
2. Корневая система мочковатая
3. Листья простые, обычно не разделены на пластинку и черешок
4. Жилкование листьев параллельное или дуговидное
5. Камбий отсутствует
6. Проводящая система в виде диффузно расположенных закрытых пучков
7. Цветки преимущественно 3-мерные, очень редко 4- или 2-мерные
8. Пыльцевые зерна однобороздные

Двудольные растения

1. Семядолей две (иногда больше)
2. Корневая система стержневая
3. Листья простые или сложные, обычно четко разделены на пластинку и черешок
4. Жилкование листьев перистое или пальчатое
5. Камбий имеется
6. Проводящая система в виде цилиндра из открытых пучков
7. Цветки преимущественно 5- или 4-мерные, иногда 3-мерные
8. Пыльцевые зерна в основном 3-бороздные



Отдел Покрытосеменные



Семейство кувшинковые

Относятся к классу двудольных покрытосеменных. Обладают многими примитивными признаками, поэтому их часто рассматривают как связующее звено между двудольными и однодольными. Происходят от предковых бессосудистых магнолиевых.

Водные травы, б.ч. корневищные. Проводящие пучки в стебле рассеянные, как у однодольных. Сосуды отсутствуют. **Цветки** крупные, одиночные, обоеполые, спироциклические.

Тычинки примитивного строения, лентовидные, с выраженным надсвязником. Опрыскиваются жуками (примитивные опылители).

Кувшинка белая (*Nymphaea alba*)

□ ♂ $\text{Ca}_4 \text{Co}_{\infty} \text{A}_{\infty} \text{G}_{(\infty)}$ -
+

Отдел Покрытосеменные

Семейство магнолиевые

Ископаемые и современные растения. Относятся к классу двудольных. Обладают многими примитивными признаками, поэтому их часто рассматривают как исходную группу покрытосеменных.

Основное разнообразие в ЮВ Азии.

Многие виды декоративные.

Жизненные формы. Деревья и кустарники, вечнозеленые или листопадные.

Цветки со **спиральным** расположением частей, реже спироциклические или циклические. Ось цветка **удлиненная**. Цветки крупные, обоеполые, часто с **неопределенным** числом чашелистиков и лепестков, или околоцветник простой.

Тычинки многочисленные, свободные, **лентовидные**, не расчленены на нить и связник.

Гинецей в типе апокарпный, плодолистики многочисленные, свободные, спирально расположенные. Плод – **спиральная многолистовка**.



Магнолия крупноцветковая
(*Magnolia grandiflora*)

♂ P₉ A_∞ G_∞



Отдел Покрытосеменные

Семейство **лютиковые**



Более продвинуты, чем магнолиевые.
Включают 50 родов и около 2000 видов.
Основное разнообразие в умеренном и холодном
поясе Северного полушария.

Жизненные формы. Преимущественно **травы**,
редко лианы или кустарники.

Листья простые или сложные, без прилистников.

Цветки со спиральным расположением частей,
реже спироциклические или циклические. Ось
цветка короткая. Обоеполые, число чашелистиков
и лепестков обычно фиксировано. Симметричные
(актиноморфные), реже несимметричные,
зигоморфные (**аконит**, фото).

Тычинки многочисленные, свободные,
расчленены на нить и связник.

Аконит (*Aconitum lycoctonum*)



Отдел Покрытосеменные

Семейство **лютиковые**

Гинецей в типе апокарпный, плодолистики многочисленные, свободные, спирально расположенные.

Семена с маленьким зародышем и обильным эндоспермом.


Многие лютиковые – ранневесенние растения, например, [ветреница](#) (*Anemone*) и [печеночница](#) (*Hepatica*).

Характерные местообитания: сырье и избыточно влажные места, иногда в воде (например, [водный лютик](#) – *Batrachium*).

Полезные свойства: некоторые ([стародубка](#), [аконит](#)) лекарственные.

Среди лютиковых много декоративных растений.

Стародубка весенняя (*Adonis vernalis*)



Отдел Покрытосеменные

Семейство **лютиковые**



Foto: Arne Anderberg

Калужница болотная
(*Caltha palustris*)

⊕ $\text{O}_5\text{A}_\infty\text{G}_\infty$
+



Foto: Arne Anderberg

Печеночница удивительная
(*Hepatica nobilis*)

⊕ $\text{O}_6\text{P}_6\text{A}_\infty\text{G}_\infty$
+