

## Уровни организации нервной системы






Рис. Уровни организации нервной системы.



## Электроннограмма нейрона коры




# Электроннограмма синапса




# Микрофотография нейронов и синапсов




## Модель тела нейрона с множеством синапсов



# Гистологические срезы мозга улитки






*Нервная система:*

1 – 1 – головной мозг; 2 – спинной мозг; 3 – нервы; 4 – нервные узлы (отмечены точками красного цвета)

# Основные ритмы электроэнцефалограммы

Альфа-ритм — ритмическое колебание потенциалов с частотой 8—13 Гц, выражен чаще в задних отделах мозга при закрытых глазах в состоянии относительного покоя, средняя амплитуда 30—40 мкВ, обычно модулирован в веретена



Бета-ритм — ритмическое колебание потенциалов с частотой 14—35 Гц. Лучше выражен в лобно-центральных областях мозга



Дельта-волна — одиночное двухфазное колебание разности потенциалов длительностью более 250 мс



Дельта-ритм — ритмическое колебание потенциалов с частотой 1—3 Гц и амплитудой от 10 до 250 мкВ и более

Тета-ритм — ритмические колебания потенциалов с частотой 4—7 Гц, чаще двусторонние синхронные, амплитудой 100—200 мкВ, иногда с веретенообразной модуляцией, особенно в лобной области мозга





Рис. 2.1 Основные ритмы и параметры энцефалограммы




## Расположение электродов на поверхности головы



Система «10—20»


Расположение электродов на поверхности головы. F — лобная область, С — центральная, Р — теменная, Т — височная, О — затылочная. Нечетные индексы — левая половина головы, четные индексы — правая, Z — средняя линия.

# Компоненты звукового вызванного потенциала



Основные компоненты звукового ВП, зарегистрированного между вертексом и правым сосцевидным отростком в ответ на щелчок (60 дБ над уровнем порога), предъявляемый на правое ухо с частотой 1 Гц.


## Импульсная активность нейронов




Варианты осциллограмм импульсной активности нейронных популяций, регистрируемых в различных корковых и подкорковых структурах.

Вверху — отметки времени (100 мс). Латинские буквы справа — условные обозначения структур мозга человека (по Н.П.Бехтеровой с соавт., 1985)


## Кожно-гальваническая реакция при решении задачи



# Детектор лжи



# Пауки и лекарства



## ПЭТ- сканирование мозга плохо читающего мальчика



# ПЭТ- сканирование мозга -вымысел и реальность

