

# ВЫМЕРШИЕ ЖИВОТНЫЕ

Выполнила Галянич  
Валя 7 кл.

# Мамонтёнок



# Большерогий олень



# Археоптерикс



**Время обитания:** юрский период

**Размер:** 38 см

**Открыт:** в Германии

**Рацион:** насекомые, черви, ящерицы

**Другие данные:** порхал с места на место, вместо того чтобы летать; имел клюв и усеянные зубами челюсти; возможно, является недостающим звеном между динозаврами и птицами.

# Синозавроптерикс



**Время обитания:** юрский период

**Размер:** 51 см

**Открыт:** в Китае

**Рацион:** черви, насекомые, ящерицы, мелкие млекопитающие

**Другие данные:** научное название *Sinosauropteryx prima*; хрупкое телосложение; древний предок птиц; длинные волокна вместо настоящих перьев; не умел летать.

# Дронт



**Время обитания:** до конца XVII века

**Размер:** 1 м

**Открыт:** на острове Маврикий

**Рацион:** плоды «дерева додо», т. е. кальварии, и возможно, насекомые

**Другие данные:** научное название *Raphus cucullatus*; фигурирует в книге Льюиса Кэррола «Алиса в Стране Чудес»; необычный клюв; не могла летать.



# Перелётный голубь



**Время обитания:** до 1914 года

**Размер:** 40 см

**Открыт:** в Северной Америке

**Рацион:** желуди, орехи, фрукты

**Другие данные:** научное название *Columba migratoria*; летали огромными стаями спирального построения; возможно, самые многочисленные из птиц.

# Шуазельский голубь



**Время обитания:** до середины XX века

**Размер:** 30 см в длину

**Открыт:** на острове Шуазель

**Рацион:** вероятно, орехи, фрукты и семена

**Другие данные:** научное название *Microgoura meeki*; низкий, вибрирующий крик; красивый хохолок на голове; никогда не был многочисленным видом; возможно, уничтожен кошками.



# Гагара бескрылая



**Время обитания:** до 1844 года

**Размер:** 76 см

**Открыт:** в северных водах  
Атлантического океана

**РАЦИОН:** преимущественно  
рыба

**Другие данные:** научное  
название *Alca impennis*, также  
известна как чистик; была  
истреблена ради мяса и пуха;  
огромный клюв; хороший  
пловец; неуклюжая на суше.

# Белоклювый дятел



**Время обитания:** до 1972 года

**Размер:** 60 см

**Открыт:** в Северной Америке

**Рацион:** насекомые, черви

**Другие данные:** научное название *Campephilus principalis*; вырубка лесов разрушила его среду обитания; красный хохолок на голове; коренные американцы использовали клювы для изготовления корон.

# Очковый баклан



**Время обитания:** до середины XIX века

**Размер:** 96,5 см

**Открыт:** на острове Беринга

**Рацион:** преимущественно рыба

**Другие данные:** научное название *Phalacrocorax perspicillatus*; изогнутая шея; отметины вокруг глаз, напоминающие очки.

# Хохочущая сова



**Время обитания:** до 1917 года

**Размер:** 48 см

**Открыт:** в Новой Зеландии

**Рацион:** черви, жуки, крысы и ящерицы

**Другие данные:** научное название *Sceloglaux albifacies*; не выносила дневного света; при полете издавала крик, похожий на смех, отчего и произошло название.

# Загадочный скворец



**Время обитания:** до середины XIX века

**Размер:** 18 см

**Открыт:** на острове Мауке

**Рацион:** вероятно, фрукты, орехи, семена

**Другие данные:** научное название *Aplonis mavornata*; экспонат Британского музея естественной истории; об этом виде мало известно, отсюда название.

# Каролинский попугай



**Время обитания:** до 1918 года

**Размер:** 30 см

**Открыт:** в Северной Америке

**Рацион:** вероятно, семена, плоды фруктовых деревьев

**Другие данные:** научное название *Conuropsis carolinensis*; ярко-желтая голова; истреблены, так как уничтожали фрукты и посевы



# Красивый попугайчик



**Время обитания:** до 1927 года

**Размер:** 28 см в длину

**Открыт:** в Австралии

**Рацион:** преимущественно семена трав

**Другие данные:** научное название *Psephotus pulcherrimus*; очень доверчивый; самки устраивали гнезда в термитниках; когда-то любили кормиться семенами трав.

# Гавайская цветочная Мамо



**Время обитания:** до конца XIX века


**Размер:** 20 см

**Открыт:** на Гавайях

**Рацион:** преимущественно нектар и насекомые

**Другие данные:** научное название *Drepanis pacificus*; печальное пение; красивое оперение; длинный изогнутый клюв; прозван «королевской птицей» вождями гавайских племен.

# Гуадалупская каракара



**Время обитания:** до конца XIX века

**Размер:** 56 см

**Открыт:** на острове Гуадалупе

**Рацион:** преимущественно моллюски и насекомые

**Другие данные:** научное название *Polyborus lutosus*; нападала на домашнюю птицу и козлят; любила убивать; гнездилась в скалах; издавала звуки только припадении.

# Моа



**Время обитания:** вероятно, до 1600 года

**Размер:** до 3,6 м

**Открыт:** в Новой Зеландии

**Рацион:** корни, побеги, личинки насекомых, насекомые

**Другие данные:** научное название *Dinornis torosus*; нелетающая птица; яркое оперение; крупные яйца; похожа на страуса; длинные стройные ноги.

# Королевский кондор



**Время обитания:** до 1800 года

**Размер:** 65 см

**Открыт:** в Северной Америке

**Рацион:** лягушки, ящерицы,  
пресмыкающиеся

**Другие данные:** научное  
название *Sarcoramphus sacra*;  
кремовое оперение; длинный  
клюв; лысая шея; красная  
корона на голове; по мнению  
некоторых специалистов, всего  
лишь мифическая птица.

# Эпиорнис



**Время обитания:** до середины XVIII века

**Размер:** 3 м

**Открыт:** на Мадагаскаре

**Рацион:** листья и другая растительность

**Другие данные:** научное название  
*Aepyornis maximus*; огромные яйца;  
возможно, была истреблена человеком;  
массивное тело; персонаж многих легенд.



# Тетерев вересковый



**Время обитания:** до 1932 года

**Размер:** размером с курицу

**Открыт:** в Северной Америке

**Рацион:** преимущественно семена и любой другой попавшийся корм

**Другие данные:** научное название *Tetraochnus curido*; лесные пожары уничтожили места гнездований; замедленная реакция.

# Тилацин



**Время обитания:** до 1936 года

**Размер:** 1,8 м в длину

**Ареал:** Австралия, Тасмания и Новая Гвинея

**Рацион:** хищник


**Другие данные:**

открывающаяся назад сумка, как у опоссума, следовательно,

относился к сумчатым;

научное название *Thylacinus cynocephalus*.

# Квагга



**Время обитания:** до 1878 года


**Размер:** высотой с зебру

**Ареал:** ЮАР

**Рацион:** растительность

**Другие данные:** на нее охотились из-за ее шкуры; нападали шакалы; была приручена для охраны скота; научное название *Equus quagga*.

# Голубая антилопа



**Время обитания:** до 1800 года

**Размер:** с оленя

**Араел:** луга Капской провинции, ЮАР

**Рацион:** растительность

**Другие данные:** ее мясом кормили собак;

научное название

*Hippotragus leucophaeus*

# Сирийский кулан



**Время обитания:** до 1927 года

**Размер:** рост 0,9 м

**Ареал:** пустынные территории Сирии, Палестины, Саудовской Аравии и т. д.

**Рацион:** растительность

**Другие данные:** забивался для употребления в пищу; нестадное животное; также известен под названием онагр, или дикий осел; научное название *Equus hemionus hemippus*.

# Кенгуру Грея



**Время обитания:** до 1940 года

**Размер:** до 0,9 м в длину

**Ареал:** малонаселенные районы Австралии


**Рацион:** растительность

**Другие данные:**

сумчатое; на него охотились ради его шкуры; быстроногое; научное название *Macropus greyi*.



# Проехидна



**Время обитания:**

меловой период

**Размер:** 1 м в длину

**Ареал:** Австралия

**Рацион:**

преимущественно  
муравьи и термиты

**Другие данные:**

однопроходное;

длинный язык;

научное название

*Zaglossus hacketti*.

# Кенгуровая крыса



**Время обитания:** некоторые виды живы и по сей день, другие вымерли до 1908 года

**Размер:** до 60 см в длину

**Рацион:** растительность и отбросы

**Ареал:** заросли кустов вдоль русел рек в Австралии

**Другие данные:** сумчатые; становились жертвой кошек, лис и людей; длинные хвосты; научное название кенгуровой крысы Гилберта *Potorous gilberti*.

# Вымершие бандикуты



**Время обитания:** некоторые вымерли к 1940 году, но несколько видов осталось  
**Размер:** меньше кроликов  
**Ареал:** австралийские луга  
**Рацион:** преимущественно растительность  
**Другие данные:** сумчатые; была уничтожена естественная среда обитания; научное название восточного полосатого бандикута *Perameles fasciata*.

# Карибу Доусона



**Время обитания:** до 1908 года  
**Размер:** примерно 1,5 м от плечевого сустава  
**Ареал:** острова Королевы Шарлотты, Канада  
**Рацион:** растительность  
**Другие данные:** человек охотился на него ради шкуры и мяса; обитал в болотистых областях, пока они не были осушены; научное название *Rangifer tarandus dawsoni*.

# Американский бизон



**Время обитания:** начиная с 200 000 лет назад до наших дней

**Размер:** современные бизоны меньше своих предков

**Рацион:** растительность

**Ареал:** первоначально Азия, а затем прерии Северной Америки

**Другие данные:** когда-то был очень многочисленным, но подвергся истреблению ради шкур и мяса; кости, рога и копыта также использовались для изготовления орудий труда; спасен от полного уничтожения.



# Гигантский бобр



**Время обитания:** более 10 000 лет назад

**Размер:** 2,7 м в длину


**Ареал:** Северная Америка

**Рацион:** преимущественно рыба

**Другие данные:** герой многих индейских легенд; обитал в реках и озерах; дальний родственник современных бобров; останки впервые обнаружены в торфяном болоте; превосходный пловец.



# Карликовый слон



**Время обитания:** плейстоцен и голоцен  
**Размер:** рост менее 1 м  
**Ареал:** Сицилия  
**Рацион:** растительность  
**Другие данные:** эти низкорослые слоны были миниатюрной копией тех слонов, которых мы знаем сегодня; научное название *Elephas falconeri*.

# Крыса - кролик



**Время обитания:** до 500 года  
н. э.

**Размер:** до 30 см в длину

**Ареал:** горная местность на  
Корсике

**Рацион:** трава и другая  
растительность

**Другие данные:** вероятно,  
вымерла из-за чрезмерного  
истребления человеком;  
известна также как пищуха;  
научное название *Prolagus  
corsicanus*.

# Фолкледская лисица



**Время обитания:** до 1876 года  
**Размер:** как у других лис  
**Ареал:** Фолклендские острова  
**Рацион:** хищник  
**Другие данные:** на нее охотились ради шкуры; отстреливали, так как она убивала овец; также известна как антарктический волк; научное название *Dusicyon australis*.

# Карибский тюлень-монах



**Время обитания:** до 1952 года

**Размер:** 2,1 м в длину

**Ареал:** Карибский бассейн

**Рацион:** рыба и ракообразные

**Другие данные:** подвергся чрезмерному истреблению ради шкур и мяса; время от времени выбирался на сушу для размножения; научное название *Monachus tropicalis*.

# Сителлерова корова



**Время обитания:** до 1768 года

**Размер:** 9 м в длину

**Рацион:** различная рыба и морские водоросли

**Ареал:** на острове Беринга в северной части Тихого океана его;

**Другие данные:** огромное морское млекопитающее; названо по имени Георга Стеллера, исследователя, который открыл его; научное название *Hydrodamalis stelleri*.

# Тур



**Время обитания:** до 1627 года

**Размер:** рост 2 м

**Ареал:** большая часть Европы и Азии

**Рацион:** трава и другая растительность

**Другие данные:** чрезвычайно сильный; очень длинные рога; жестоко истреблялся людьми; научное название *Bos primigenius*.





Спасибо за  
ВНИМАНИЕ