

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ



Дурман
обыкновенный



Признаки отравления

Появляются спустя 30-60 мин.

После употребления семян.

Лицо и шея краснеют.

Обильное слюноотечение сменяется
резкой сухостью во рту.

Возникают тошнота и рвота.

Судороги рук и ног.

Возбужденное состояние, возникают
галлюцинации

Первая помощь

Промыть желудок раствором поваренной соли (1ст. ложка на 5л. воды), дать активированный уголь. Снова промыть желудок слабым раствором марганцовки.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО



**Первая помощь. Промыть желудок ,
дать активированный уголь. При
рвоте - глотать мелкие кусочки льда.**

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

При попадании ягод или сока в желудок: возникает жжение во рту, затрудняется глотание, слюнотечение, боли в желудке, рвота. Сок, попавший на кожу, может вызвать боль, красноту, отек и даже пузыри и язвы.

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ



■ ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

◆ Учащение

пульса

◆ Одышка

◆ Боль в животе

◆ Тошнота

◆ Потеря сознания

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- ❖ Промыть желудок и дать слабительное.
- ❖ Если без сознания: уложить на бок, чтобы не запал язык и не наступило удушье.
- ❖ Вызвать скорую помощь.

КРАСАВКА, ИЛИ БЕЛЛАДОННА



- ◆ Повышается температура тела
- ◆ Расширяются зрачки
- ◆ Покраснение лица и глазных яблок
- ◆ Головная боль
- ◆ Головокружение
- ◆ Тошнота

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- ❖ Промыть желудок: водой или чаем. Вызвать рвоту.
- ❖ Если человек испытывает боль в сердце, дать сердечные капли или таблетку валидола



Отравление грибами

Отравление - это острое заболевание, возникающее в результате нарушения внутренней среды организма, повреждения органов и тканей, вызванных ядовитыми веществами.

Ядовитые вещества, или яды, действуют даже в малых дозах с одинаковым токсическим действием на людей.

Первые признаки отравления грибами проявляются через несколько часов (1,5 -3 часа). На фоне быстро нарастающей слабости проявляется слюнотечение, тошнота, многократная чувствительная рвота, сильные боли в животе, головная боль, головокружение. Вскоре возникает понос и симптомы поражения нервной системы: расстройство зрения, бред, судороги и др.

Первая помощь: начать с промывания желудка водой, лучше слабым раствором марганцовки и вызвать рвоту. И так несколько раз. Затем дают слабительное и несколько раз ставят очистительные клизмы. После этих процедур больного необходимо согреть (Укрыть дать чай). Необходимо больного доставить в лечебное учреждение.