

Заболелвания передающиеся половым путем

Выполнила: Ученица 8 класса Б
МОУ СОШ № 23
Новикова Яна


- Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), вызывают бесплодие у мужчин и женщин, простатит – у сильной половины человечества и воспалительные заболевания органов малого таза – у слабой. В некоторых случаях ЗППП приводят к развитию онкологических заболеваний и даже смерти. Лучшая профилактика таких болезней – это осторожность в выборе партнера. Если заражение все же произошло, самолечение недопустимо : только врач может подобрать необходимое лечение. Если заражение все же произошло, самолечение недопустимо : только врач может подобрать необходимое лечение. Если заражение все же произошло, самолечение не допустимо: только врач может подобрать необходимое лечение.

Хламидиоз



Бактериальная инфекция . У женщин хламидии может вызывать воспаление шейки матки и других органов малого таза, которые находятся на первом месте среди причин внематочных беременностей и женского бесплодия. У мужчин хламидийная инфекция проявляется воспалением мочеиспускательного канала и придатков яичек.

Гонорея (ТРИПЕР)



Бактериальное заболевание, возбудителем которого является *Neisseria gonorrhoeae*. Появляется она обычно у людей, имеющих нескольких половых партнеров, особенно у тех, кто предпочитает незащищенный половой акт. Гонорея лечится относительно легко, однако при отсутствии адекватного и своевременного лечения может вызывать опасные осложнения. Иммунитета к гонококку не вырабатывается, и человек вновь может заболеть. Это заболевание у мужчин проявляется гнойными выделениями из пениса, болями и жжением при мочеиспускании, и (редко) сильными болями в кишечнике с прожилками крови в кале. жжение при мочеиспускании.

У женщин обнаруживаются боль и жжение при мочеиспускании, выделения из влагалища желтого и красного цвета, острая боль, лихорадка и влагалищные кровотечения. Гонореей могут заражаться новорожденные дети при прохождении по родовым путям, при этом через несколько дней после рождения появляются желтые гнойные выделения из глаз.

Сифилис



Очень заразная инфекция, вызываемая спирохетами и передающаяся при любых видах полового акта. Наиболее распространено заболевание среди людей, имеющих нескольких половых партнеров, особенно для тех, кто не использует барьерные методы контрацепции. Первая стадия заболевания начинается приблизительно через 10 дней после заражения и проявляется в виде безболезненного твердого шанкра (язвы) на наружных половых органах, анальном отверстии, и реже пальцах, руками инфекция может быть занесена в ротовую полость.

В результате такие же язвы появляются в ротовой полости и глотке. Ещё один характерный симптом увеличенные лимфатические узлы. При отсутствии лечения, инфекция, прогрессирует, может перейти в две следующих стадии. Наиболее тяжелой является третья. Она характеризуется появлением кожной сыпи по всему телу (включая ладони и подошвы), которая может быть постоянной или периодически исчезать, язв в ротовой полости и глотке, увеличением лимфатических узлов по всему телу, головными болями, болями в костной ткани, лихорадкой, потерей аппетита, и выпадением волос, менингитом (воспаление оболочек головного мозга). На этой стадии возникают серьёзные осложнения, такие как паралич, сердечные отклонения, психические заболевания. Вред, наносимый организму, может быть настолько серьёзным, чтобы вызвать смерть.

Трихомониаз



Бактериальная инфекция, передающаяся половым путём. Вызывается она одноклеточным паразитом *Trichomonas vaginalis*. Этот паразит передаётся при половом акте, у женщин наиболее часто поражается влагалище, а у мужчин мочеиспускательный канал. Трихомониаз часто протекает без клинических проявлений (особенно у мужчин). Обычно симптомы появляются по прошествии 20 дней с момента заражения. У женщин это могут быть густые жёлто-зелёные вагинальные выделения, боль при половом акте, неприятный запах из влагалища, покраснение наружных половых органов, зуд, боль в нижней части живота. У мужчин - выделения из пениса, болезненное и затрудненное мочеиспускание.