



Заяц-беляк и заяц-русак

Морфологический Заяц-беляк



- Длина тела зайца от 45 до 75 см, масса от 2,5 до 5,5 кг. Уши относительно короткие, лапы широкие и сильно опушенные. Хвост обычно сплошь белый; относительно короткий и округлый. Летняя окраска шерсти рыжевато-бурая, зимняя снежно-белая, лишь кончики ушей остаются у него черными.

Морфологический Заяц-русак



- Длина тела русака 50-70 см, весит от 4-5 кг иногда до 7 кг. Внешне русак хорошо отличается от беляка более длинными ушами длинным клиновидным хвостом . Летом он ярче беляка желтовато-палево-рыжий, а зимой его мех становится густым и пышным.

Физиологический Заяц-беляк



- Сезон гона зайца-беляка длится с февраля по июль, зайчата появляются после семинедельной беременности в период с марта по август.

Физиологический Заяц-беляк



- Период размножения русака довольно продолжителен и длится с января (на юге) до сентября. Зайчата появляются после семинедельной беременности в период с апреля по август.

Географический Заяц-беляк



- Обитает на всей территории лесной и лесостепной зон Евразии, на севере Северной Америке, южном и западном побережье Гренландии.

Географический Заяц-русак



- Обитает в степях, лесостепях и на открытых пространствах лесной зоны Европы, Азии, на юге Западной Сибири и в Северной Африке. Акклиматизирован в Южной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Северной Америке.

Экологический Заяц-беляк



- Беляк-житель лесов. Наибольшей численности вид достигает в смешанных лесах, где хорошо развит травостой и богат подлесок лиственных пород. Сплошные массивы хвойного леса его не привлекают.

Экологический Заяц-русак



- Русак – житель открытых пространств. Излюбленные места его обитания - целинные степи, поймы широких рек, с/х угодья, небольшие перелески и заросли кустарников. Иногда встречается поблизости от населённых пунктов, где его осенью привлекают огороды, а зимой сады.

Репродуктивный



- В природе беляк и русак могут скрещиваться, но их гибрид заяц – тумак остаётся бесплодным.

Спасибо за внимание!