



# Железы внутренней секреции



Учителя МОУ «Ново-Булгаринская СОШ»  
Сайфулиной Л. Ш.



**Эндокринология** (от греч. ἔνδον — внутрь, κρίνω — выделяю и λόγος — слово, наука) — наука о строении и функции желез внутренней секреции (эндокринных желез), вырабатываемых ими продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных нарушением функции этих желез или действия этих гормонов.

Клетки эндокринных желез вырабатывают соки (секрет желез), содержащие специфические для каждого эндокринного органа вещества называемые гормонами и выделяют их непосредственно в кровоток. В этом заключается их отличие от желез экзокринных, которые выделяют свой секрет в проток выходящий на наружную поверхность тела (слюнные, потовые железы, железы желудка, легких).




**Гормон – это химическое вещество, которое поступает в кровоток и с кровью достигает различных органов, где оно стимулирует или снижает активность других клеток, которые называются клетками-мишениями. Через клетки-мишени гормоны оказывают действие практически на все жизненно важные функции организма человека**

## **Надпочечники:**


Надпочечники (*glandulae suprarenales*) - парный орган, расположенный у высших позвоночных вблизи верхнего полюса почки, включает две самостоятельные эндокринные железы: кору надпочечников (*substantia corticalis*) и мозговой слой надпочечников (*substantia medularis*).

Гормоны, выделяемые надпочечниками: альдостерон, кортизол, кортикостерон




# Нарушение деятельности надпочечников

- Гиперфункция кортикоидов: раннее половое созревание, быстрое прекращение роста.
- Гипофункция: бронзовая болезнь (бронзовый оттенок кожи, слабость, похудение).
- Гиперфункция адреналина: учащенное сердцебиение, повышение пульса, давления, особенно при испуге и страхе.
- Гипофункция: недостатка почти не бывает, т.к. количество регулируется НС.



## Щитовидная железа:




Железа внутренней секреции. Играет важную роль в регуляции обмена веществ и энергии в организме. Фолликулы щитовидной железы обладают уникальной способностью захватывать йод из кровотока, который при участии особого фермента связывается тиреоглобулином коллоида щитовидной железы, после чего в фолликулах синтезируются 2 йодсодержащих гормона - тироксин (T4) и трийодтиронин (T3) и 1 пептидный гормон - кальцитонин (тиреокальцитонин).  
Функция щитовидной железы зависит от поступления питательных веществ. Уровень общего T3 может повышаться при переедании и высокоуглеводной диете и снижаться при голодании и низкоуглеводной диете. Напротив, уровни T4 и ТТГ не зависят от калорийности и состава рациона.

# Заболевания щитовидной железы

- При избытке гормона(гиперфункции) развивается Базедова болезнь, выражаяющаяся в повышении обмена веществ, возбудимости нервной системы, развитии зоба.
- При гипофункции- Микседема, выражаяющаяся в понижении обмена веществ, возбудимости НС, отечности, вялости.

## ■ Железа поджелудочная.



- Поджелудочная железа (*pancreas*) - непарный орган смешанной секреции, расположенный в брюшной полости слева под желудком. Ее экзокринная часть представлена ацинозной тканью (зимогенной тканью), эндокринная часть - примерно 1-2 млн. островков Лангерганса (составляющим 1-2% массы всей железы).
- Гормоны поджелудочной железы: глюкагон, другие гормоны из проглюкагона, инсулин
- Соматостатин, панкреагастрин, секретин, панкреатический пептид


# Воздействие инсулина на организм


- Регулирует содержание глюкозы в крови, синтез гликогена из глюкозы.
- Гиперфункция: Шок, сопровождающийся судорогами и потерей сознания при падении уровня сахара в крови (гипергликемия)
- Гипофункция: сахарный диабет, при котором уровень глюкозы в крови повышается, появляется сахар в моче.

## Тимус

Тимус, как центральный орган иммунной системы, представляет собой эволюционное приобретение позвоночных животных. У всех беспозвоночных он отсутствует даже в зачаточной форме. Его возникновение у примитивных позвоночных было бесспорно ключевым явлением в эволюции иммунитета, и по своей значимости это событие следует отнести к эволюционному процессу, подходящему под определение ароморфоза.

Тимус (вилочковая железа) - лимфо-эпителиальный орган - расположен у млекопитающих в грудной полости над сердцем. Он состоит из двух основных долей, которые делятся на мелкие дольки, основа которых образована переплетением эпителиальных клеток.





## ▪ Гипофиз:

- Гипофиз, нижний мозговой придаток, или питуитарная железа (*hypophysis cerebri, glandula pituitaris*), - сложный эндокринный орган, расположенный в основании черепа в турецком седле основной кости и анатомически связанный ножкой с дном третьего мозгового желудочка промежуточного мозга. Он состоит из трех долей: передней доли гипофиза, средней доли гипофиза и задней доли гипофиза. Передняя и средняя доли объединяются под названием adenогипофиз (аденогипофиз), а задняя доля называется нейрогипофизом. К нейрогипофизу относят также срединное возвышение медиальная эминенция, расположенное на границе между adenогипофизом и гипоталамусом промежуточного мозга.
- Гормоны гипофиза: адренокортикотропный гормон (АКТГ), лутеинизирующий гормон (ЛГ), гонадотропин, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), тиреотропный гормон (ТТГ), гормон роста, соматотропин (СТГ), пролактин, гормон, стимулирующий интестинальные клетки (ГСИК), липотропин бета-липотропин, гамма-эндорфин

## Заболевания гипофиза и связанные с патологией гипофиза

Акромегалия

Болезнь Иценко – Кушинга

Несахарный диабет

Синдром Шихана

Гипофизарный нанизм

Гипофизарный гипотиреоз

Гипофизарный гипогонадизм

Гиперпролактинемия


Гипофизарный гипертиреоз

Гигантизм



# Эпифиз или шишковидная железа

- Располагается в борозде среднего мозга
- Вырабатывает мелатонин
- Влияет на гипофиз, щитовидную, паращитовидные, половые железы и надпочечники.



# Половые железы

- Яичники выделяют гормоны эстрadiол и прогестерон
- Семенники (яички) выделяют тестостерон
- Влияют на развитие вторичных половых признаков, половое поведение.

