



Все о прививках

Подготовила:

Воспитатель разновозрастной
группы

Кашина Татьяна Вадимовна

2017 год.



**«Я ПРИВИВОК НЕ БОЮСЬ, ЕСЛИ
НАДО -УКОЛЮСЬ!»**



*Чем больше знаешь, тем интереснее
жить...»*

К.Г. Паустовский



**По мнению учёных, прививки
оказывают положительное
воздействие на организм.**



ЦЕЛИ

- Изучить историю вакцинации. Кто был основоположником этого метода.
- Выяснить, какую защиту приобретает организм с помощью прививки.
- Рассмотреть механизм выработки иммунитета.
- как проводиться вакцинация в местном лечебном учреждении.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Метод вакцинации является самым старым и надежным . Он известен уже около 200 лет и до сих пор верно служит человечеству. Первые попытки борьбы с вирусными заболеваниями были приняты задолго до открытия вакцин.

1796 - английский врач-хирург Эдвард ДЖЕННЕР впервые сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

Болезнь не развилась - защита была безупречной. Дженнер отослал в Королевское научное общество описание своего открытия.

ДЖЕННЕР И

«ОСПА»



В 1803 году в Лондоне был основан институт оспопрививания и назывался он Дженнеровский институт.

Дженнер был его первым и пожизненным руководителем. О

Дженнере писали в то время: “Ланцет Дженнера спас гораздо больше человеческих жизней, чем погубила шпага Наполеона”.

Первые упоминания о прививках против оспы относятся к 1100 году в Китае.

В 1721 году прививание против оспы вводится в Великобритании, затем в 1768 году в России личным примером Екатерины II.

В 1796 году появляется слово “вакцинация”, от латинского слова “УАССА” - корова, так как Эдвард Дженнер сделал прививку против коровьей оспы.

С 1798 года была объявлена всеобщая вакцинация против оспы. В 1966 году ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) объявила программу искоренения оспы.

В 1977 году был зафиксирован последний случай естественного заражения оспой в мире

С 1980 года в России была отменена вакцинация против этого страшного заболевания.

ЧТО ТАКОЕ

ВАКЦИНАЦИЯ?

- Вакцинация - это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты против инфекционных болезней, известное современной медицине.
- Основным принципом вакцинации является то, что пациенту дается ослабленный или убитый болезнетворный агент (или искусственно синтезированный белок, который идентичен белку агента) для того, чтобы стимулировать продукцию антител для борьбы с возбудителем заболевания.



Иммунитет

Приобретенный

Врожденный

↓
вакцинация

(приобретается в результате контакта организма с антигеном;)

(обуславливает однотипные реакции на любые чужеродные антигены.)




ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Вакцина	Рекомендуемая чистота вакцинации
Против заболевания столбняка и дифтерии	Каждые 10 лет
Против вируса гепатита В	В любом возрасте, если вакцинация не проведена в детстве.
Против гриппа	В возрасте старше 65 лет или ежегодно при наличии хронических заболеваний
Против пневмококка, вызывающего пневмонию	Однократно в возрасте старше 65 лет
Другие	В случае выезда в районы с высокой распространённостью опасных инфекционных болезней.

ПРИВИВКИ ДЕТЯМ

- В нашей поликлинике проводят обязательные прививки детям против инфекций : гепатита «В», паратифно - корьевая, АКДС, АДС, АДС-М, реакция Манту, БЦЖ , полиомиелита, краснухи.



Календарь профилактических прививок для детей

Новорожденные (первые 12 часов) - первая вакцинация против вирусного гепатита В.

Новорожденные (3-7 дней) - вакцинация против туберкулеза.

1 месяц - вторая вакцинация против вирусного гепатита В.

3 месяца - первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.

4,5 месяца - вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита.

6 месяцев - третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, вирусного гепатита В.

12 месяцев - вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита.

18 месяцев - первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.

20 месяцев - вторая ревакцинация против полиомиелита.

6 лет - ревакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи.

7 лет - первая ревакцинация против туберкулеза и вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка.

14 лет - третья ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита, вторая ревакцинация против туберкулеза.



ВЫВО

Итак, мы выяснили:

Д:

- ❑ **вакцинация** является основным профилактическим методом предупреждения опасных инфекций.
- ❑ В нашем лечебном учреждении строго следят за графиком профилактических прививок.
- ❑ Среди детей непривитых нет. Среди взрослого населения непривиты только по медицинским показаниям.
- ❑ Население к профилактическим прививкам относится положительно.



□ Будешь делать ты
прививку,
будешь ты всегда
здоров!



***«Только осуществляя
свои лучшие мечты,
человечество
продвигается вперед».***
К.А. Тимирязев