


Лимуры – ночные охотники


Работа ученицы 4 «Г» класса Поповой Лизы



Лемуры – ночные охотники



□ (



Лемурами римляне называли души умерших, среди которых добрые охраняли семью и дом, в виде Ларов, а злые, в виде блуждающих и злобных привидений, тревожили бедных смертных.



Нет такого животного, которое бы более напоминало нам нас самих, чем обезьяна.

Всего существует около 200 видов приматов из 50 родов.

Отряд делят на два подотряда: низшие приматы и высшие приматы.

Лемур относится к низшим приматам





Это существо называется также **кошачьим лемуром**, так как он размером с кошку, покрыт сизо-серой шерстью, мордочка, уши и брюшко беловатого цвета, оконечность морды и окружность глаз – черные, имеет пару лимонно-желтых глаз и довольно длинный хвост, украшенный черными и белыми кольцами. Крик лемура похож на кошачье мяуканье!


Рацион зверька состоит
главным образом из
фруктов, в их меню также
входят листья, цветы,
травянистые растения и
иногда насекомые.





- Брачный период сезонный, начинающийся в середине апреля. За один раз лемуры рожают по одному детёнышу, иногда встречаются и двойни. Потомство появляется на свет между августом и октябрём, перед сезоном дождей. Самки размножаются ежегодно, длительность беременности составляет примерно 222 дня, а вес детёныша при рождении — от 80 до 120 грамм. Новорождённый хватается за шерсть матери и виснет на ней.





□ Этому
маленькому
чуду всего 4
дня ...

В первые месяцы самки носят своих детёнышей на животе, затем на спине. В возрасте 1-2 месяцев детеныш постепенно покидает спину матери и делает самостоятельные вылазки, возвращаясь к матери во время сна и кормления, и в возрасте 5-6 месяцев они становятся полностью самостоятельными. Через пять месяцев они отвыкают от молока. Самки становятся половозрелыми в возрасте 20 месяцев, самцы в возрасте двух с половиной лет. Период жизни кошачьих лемуров составляет от 34 до 37 лет. >>



- По сравнению с другими лемурами, **кошачий лемур** встречается относительно часто. Однако и его вид определяет как находящийся под угрозой исчезновения, так как его популяция сокращается.



В настоящее время, общая численность кошачьих лемуров оценивается в от 10 до 100 тысяч особей. К основным угрозам относятся уничтожение жизненного пространства и охота!

Хвост прекрасно подходит для того, чтобы позволить кошачьему лемуру удерживать равновесие, сидя на тонком суку. Играет важную роль и в балансировании прыжков. В социальном поведении полосатому хвосту лемуров отводится большое значение. Если кошачий лемур идёт по земле, он держит хвост вертикально для лучшей заметности. С помощью хвоста самцы проводят так называемые «вонючие бои». Они смазывают хвост секретами из подмышек и выпячивают его в сторону соперника.





В обращении с предметами лемуры используют как правило передние конечности и ротовой аппарат совместно. Пищу они чаще поднимают ртом, плоды срывают или берут передними конечностями, одной или двумя, и сразу же подносят ко рту. Крупные фрукты откусывают ртом на дереве, не срывая, мелкие – подносят ко рту.





Такова краткая характеристика этих уникальных животных.

Что привлекает меня в них?

Не могу ответить однозначно. Их мягкая, теплая шкурка,

полосато-серая у

взрослых и рыжеватая у детенышей,

их огромные хвосты, украшенные кольцами,

очки на глазах, придающие их кошачьей

мордочки выражение строгое и

невероятно комичное в то же время,

их подкупающее добродушие, ласковость...





Если бы мы чаще присматривались к "братьям нашим меньшим", может, мы стали бы более добрыми и, без сомнения, более человечными. Посмотрите на этих милых созданий и поймите, что самые прекрасные творения природы живут на Земле...

