

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

ЗВЕРИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ РЯДОМ



ЧЬИ ЭТО СЛЕДЫ?

- ▣ Следы белки



ОБЫКНОВЕННАЯ БЕЛКА – SCIURUS VULGARIS

- Мелкие зверьки (длина тела 19-28 см, хвоста 13-19 см), живущие на деревьях.



ЗАЧЕМ БЕЛКЕ ХВОСТ?

- Хвост длинный, очень пушистый, служит рулем при прыжках с дерева на дерево.
- Обитают в лесах и даже городских парках.
- Ночует в дуплах .
- Перед уходом на ночевку многие белки путают следы
- В спячку на зиму не впадают. Почему?
- Питаются семенами хвойных, грибами, почками, побегами, орехами, насекомыми. Изредка поедают птенцов и яйца птиц.

КАБАН — SUS SCROFA

- Отличается от домашних свиней уплощенным с боков телом, густой серо-бурой щетиной, образующей гриву вдоль хребта, большими клыками у самцов, черным пятчком. Поросята полосатые до трехмесячного возраста **(1)**. Глаза ночью светятся темно-красным светом.
- Держатся кабаны небольшими стадами



- День проводит на лежке в глухом уголке леса или тростниковых крепей, на солнечном склоне горы. На лежке кабан раскапывает снег до земли, старается лечь на слой веток, мха и сухой травы.

- Помимо лежек и следов о присутствии в лесу кабанов свидетельствуют копки — участки вспаханной почвы, где звери кормились

- У них бывают также купальни — глубокие лужи или ямы, заполненные водой и грязью

- Копыта кабана могут широко раздвигаться, поэтому он легко ходит по болотам. Но в глубоком снегу из-за коротких ног ему приходится пропахивать грудью борозду или двигаться тяжелыми прыжками.



- Питается корневищами и луковицами растений, опавшими плодами, орехами, желудями, червями и насекомыми, а при случае также другими мелкими животными.
- Роющая деятельность кабана способствует восстановлению леса на вырубках и гарях, кроме того, он поедает в большом количестве вредителей леса.

СЛЕДЫ ЗАЙЦА


- Заяц – русак и заяц – беляк довольно крупные зверьки.
- Длина тела достигает 70 см.



- Русак летом и зимой серый.
- А беляк?



- Беляк же зимой становится совсем белым, чем и объясняется его название.



ЛОСЬ

- Самый крупный вид оленей.
- Его рост превышает 2 м.
- Кормится, как и другие лени, разнообразной растительной пищей.
- Рога есть только у самцов. Имеют широкую плоскую часть, которая называется «лопатой».



□ След лисицы



□ След волка



■ След медведя



КАКИЕ ИЗ НАШИХ ЗВЕРЕЙ
ВПАДАЮТ ЗИМОЙ В
СПЯЧКУ?

С чем это связано?

ЛЕГКО ОТЛИЧИМ ОТ ВСЕХ НАШИХ ЗВЕРЕЙ ПО КОЛЮЧЕЙ СПИНЕ

- День проводит в гнезде из веток и листьев
- Колючий панцирь не всегда спасает ежа от хищников
- Питаются насекомыми, червями и лягушками, при случае — полевками, змеями, ящерицами, птичьими яйцами и птенцами



ОБЫКНОВЕННЫЙ КРОТ — TALPA EUROPAEA

- Мелкие подземные зверьки с мощными широкими передними лапами и маленькими глазками
- При рытье глубоких ходов выбрасывают на поверхность кучки земли — кротовины округлой формы, до полуметра в диаметре . За одну ночь крот прокладывает до 50 метров хода
- Питается дождевыми червями



БАРСУК — MELES MELES

- Среднего размера приземистый зверь плотного сложения с узкой вытянутой мордой, коротким лохматым хвостом.
- Барсуки строят очень сложные норы со множеством входов, жилых камер и тупиков (так называемые барсучьи городки)
- Питается насекомыми, мышами, лягушками, различными растительными кормами



СЛЕДОПЫТУ НА ЗАМЕТКУ

- ✓ Следы передвижения – отпечатки лап и других частей тела (хвост, брюхо); сломанные кустарники, набитые тропы.

Наброды тетерева



- ✓ Следы кормовой деятельности – остатки и запасы пищи, следы поиска пищи, кормовые столики, обкусы и заломы растений, следы преследования и перетаскивания добычи и др.



- ✓ Следы. Связанные с устройством убежища – норы, логова, лёжки, ходы под снегом.



✓ Информационные следы – следы передачи территориальной информацией – царапины и закусы на деревьях и земле, выделения мускусных желёз, звуковые сигналы.



1. В КАКИЕ СТОРОНЫ ПОШЛИ ЖИВОТНЫЕ?

2. ПРОВЕДИТЕ ПО ЛАБИРИНТУ ЗАЙЦА И
ЛИСУ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ.

