

# Красная книга ХМАО

Подготовили учащиеся  
1-г класса  
Учитель: Матвеева В.Н.

# Содержание

1. История создания Красной книги.
2. Цвета Красной книги.
3. Животные, занесённые в Красную книгу ХМАО.
4. Растения, занесённые в Красную книгу ХМАО.
5. Птицы, занесённые в Красную книгу ХМАО.
6. Охраняемые рыбы ХМАО.
7. Выводы.




**Красная книга** — это книга об исчезнувших, редких и исчезающих видах растений, животных, грибов. Красный цвет ее обложки как бы предупреждает об опасности, надвигающейся на растения и животных. Название «Красная книга» предложил Питер Скотт — известный английский исследователь, ученый, орнитолог. Начало всемирной «переписи» редких животных и растений было положено а 1948 году, когда Международный союз охраны природы (МСОП) создал комиссию по редким и исчезающим видам животных (а позднее — и видам растений). Шесть лет комиссия собирала о них информацию, а потом приступила к созданию Красной книги. Одновременно составлялся и черный список растений и животных, исчезнувших с лица Земли.

назад


# Обозначение страниц Красной КНИГИ

- ❖ **1-виды исчезающие**
- ❖ **2 - виды сокращающиеся**
- ❖ **3 - виды редкие**
- ❖ **4 - виды восстановленные**




# Животные из Красной книги ХМАО



[далее](#) 

# БОБР РЕЧНОЙ



БОБРЫ (*Castor*), род грызунов; включает два вида. Бобр европейский (*Castor fiber*) распространен в лесной зоне Евразии, в пойменных лесах лесостепной и степной зон. Бобр канадский (*Castor canadensis*) распространен в Северной Америке, акклиматизирован в Финляндии, завезен на Дальний Восток (Хабаровский край, Камчатка). Оба вида очень схожи. Длина тела бобров 80-100 см, хвоста 30-35 см, масса до 30 кг. Череп мощный, лицевой отдел укорочен.

ОЛЕНИ (плотнорогие), семейство парнокопытных животных подотряда жвачных. Самцы (у северных оленей и самки) имеют рога (у большинства ветвистые), ежегодно сбрасываемые, весной вырастающие вновь. Ок. 30 видов, в Евразии, Сев. Африке, Америке, акклиматизированы в Нов. Зеландии и на ряде островов. Наиболее известны благородный олень, пятнистый олень, лань, косуля, кабарга, лось, северный олень. Объект промысла (мясо, кожа, рога). Численность ряда видов сокращается. 11 видов и 20 подвидов в Красной книге Международного Союза охраны природы и природных ресурсов.

## ОЛЕНЬ НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ



# россомаха

**РОСОМАХА** (*Gulo gulo*) — единственный вид хищного зверя рода росомых семейства куньих. Длина тела до 105 см, хвоста до 23 см; масса до 19 кг. Тело массивное, укороченное; лапы мощные, широкие; голова небольшая, с небольшими округлыми ушами. Шерсть лохматая, грубая и длинная. Окраска разнообразная, в основном темно-бурая; две светлые полосы тянутся от затылка по бокам тела.



Росомаха обитает в тайге и лесотундре Евразии и Северной Америки (в тундре самый крупный хищник после волка). Ведет одиночный образ жизни. Широкие лапы с перепонками между пальцами позволяют росомахе с легкостью передвигаться по снегу в поисках добычи. При этом росомаха прекрасно лазает по деревьям и даже может спускаться с них вниз головой. Основу питания составляет падаль: лоси, домашние и дикие олени — остатки добычи волков, медведей. Реже охотится самостоятельно, чаще на больных и раненных зверей. Часть добычи прячет про запас. Гон тянется с апреля по октябрь.





# Растения из Красной книги ХМАО.



# ВЕНЕРИН БАШМАЧОК



**БАШМАЧОК (Cypripedium),** род многолетних растений семейства орхидных. Ок. 50 видов, главным образом в умеренном поясе Северного полушария. Некоторые виды декоративны. Венерин башмачок (охраняется в Европе с кон. 19 в., в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов). Под этим же названием в оранжереях разводят тропические орхидеи из других родов.

# ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ

**ЛАНДЫШ, род  
многолетних трав  
семейства спаржевых. 1  
вид — ландыш майский с  
несколькими подвидами,  
в Евразии и Сев. Америке.**

**Лекарственное и  
декоративное растение.**



# Кедр сибирский



**КЕДР**, род хвойных вечнозеленых деревьев семейства сосновых. 4 вида, в горах Малой и Юго-Западной Азии, в Зап. Гималаях и Северо-Зап. Африке; широко культивируют, в т. ч. в Крыму, на Кавказе, юге Ср. Азии. Древесину применяют в строительстве. Кедром часто называют кедровую сосну.

**КЕДРОВАЯ СОСНА**, виды деревьев из рода сосна; часто неправильно называется кедром. Наиболее известна кедровая сосна сибирская (сибирский кедр), растущая на северо-востоке Европейской части России и почти по всей Сибири. Высота 35-40 м, диаметр до 1,8 м, живет до 500 лет; обильные урожаи орехов бывают через 5-6 лет. Кедровая сосна европейская охраняется.



# Птицы, охраняемые в ХМАО



# СТЕРХ



**СТЕРХ** (белый журавль) (*Grus leucogeranus*), птица семейства журавлиных. Масса тела около 6–8 кг, высота 1,2–1,4 м, размах крыльев 2,3–2,6 м. Самки несколько мельче самцов. Все оперение стерха, за исключением черных концов крыльев, белое; ноги, клюв и передняя часть головы красного цвета.

К образованию пар, которые создаются на всю оставшуюся жизнь, стерхи приступают в возрасте около 6 лет. Обычно самка откладывает 2 яйца. Разница между вылуплением птенцов составляет около 36 часов. Новорожденным свойственна исключительная агрессивность по отношению друг к другу, и если старший птенец оказывается здоровым, младший обречен на гибель. Молодая птица держится с родителями до следующего сезона гнездования.

Гнездится стерх только на территории России, образуя две популяции – западную (обскую), с гнездовым ареалом на севере Тюменской области, и восточную (якутскую), гнездовые участки которой расположены между реками Яна и Алазея.

**Беркут (отряд соколообразных, семейство ястребиных)- редкий вид.. Беркут – самый крупный и самый сильный из орлов. Поразительная зоркость, смелость и красота снискали ему славу среди пернатых.**

**Свои гнёзда беркуты устраивают на больших деревьях, в нишах или уступах отвесных скал. Питаются млекопитающими средней величины (сусликами, сурками, зайцами, лисицами), крупными птицами (тетеревами), а иногда нападает на молодняк копытных животных, барсуков и даже волков. Посещает и падаль во время осеннее - зимних кочёвок.**

# БЕРКУТ



# СОКОЛ - САЙКА



**СОКОЛЫ**, род хищных птиц семейства соколиных. Длина 21-66 см., самки крупнее самцов. Крылья длинные, заостренные, обеспечивающие быстрый полет. 39 видов, в России 10 видов, в т. ч. кречет, сапсан, балобан, чеглок, пустельги, кобчики. Гнездятся на земле, скалах или высоких строениях, на деревьях занимают гнезда других птиц. Крупные соколы с древности используются как ловчие птицы. Многие виды редки, охраняются.



# Краснозобая казарка



**КАЗАРКИ** (Brantd), род птиц семейства утиных. Включает четыре вида: канадская казарка (Brandt canadensis), белощекая казарка (Brandt leucopsis), черная казарка (Brandt bernicla) и краснозобая казарка (Brantd ruficolhs). К казаркам иногда отнёсят также белолобого гуся и пискульку.


Длина этих птиц до 60 см, весят до 8 кг. Они распространены на севере Евразии и Северной Америки. Краснозобая казарка гнездится только на севере России. Это перелетные птицы, они питаются травянистой растительностью. В связи с малочисленностью охота на казарок запрещена. Два вида занесены в Международную Красную книгу.



The image shows two sturgeon fish lying on a red, textured surface, possibly the deck of a boat. The fish are elongated with a pointed snout and a row of bony scutes along their back. One fish is positioned in the upper half of the frame, and the other is in the lower half. A blue rectangular box with a white border is centered over the image, containing the text 'Охраняемые рыбы ХМАО' in white serif font.

# Охраняемые рыбы ХМАО

# МУКСУН



**МУКСУН**, проходная рыба рода сигов. Длина до 75 см, весит до 8 кг. В опресненных водах Сев. Ледовитого океана. Нерест в реках. На п-ове Таймыр — озерная форма. Ценный объект промысла и разведения.


# СТЕРЛЯДЬ



**СТЕРЛЯДЬ (*Acipenser ruthenus*) — вид рыбы рода осетров. Длина до 125 (обычно 40–60) см, масса до 16 кг (обычно 0,5–2 кг). Нижняя губа, в отличие от шипа, посередине прервана. От других осетров стерлядь отличается большим числом боковых жучек (как правило, более 50) и бахромчатыми усиками. Стерлядь изменчива по форме, некоторые исследователи выделяют две формы стерляди: тупорыльную и острорыльную.**


**Стерлядь распространена в реках бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Белого и Карского морей. Это типично пресноводная рыба, но в Волге встречается полупроходная форма, которая нагуливается в Северном Каспии. Эту форму стерляди иногда выделяют в отдельный вид. Стерлядь зимует в речных ямах, весной поднимается вверх по течению до нерестилищ.**



# НЕЛЬМА



**НЕЛЬМЫ** (*Stenodus*), род рыб семейства сигов, включает единственный вид и два подвида — белорыбица и собственно нельма; длина до 1,3 м, масса до 40 кг. Нельмы распространены в бассейне Северного Ледовитого океана от реки Поной до реки Макензи. Собственно нельма (*Stenodus leucichthys nelma*) — довольно крупная рыба с серебристой чешуей. В Америке нельму называют незнакомкой. Эти рыбы предпочитают селиться в реках, они не любят соленой воды и потому придерживаются опресненных приустьевых пространств в океане. В сибирских реках нельма совершает значительные миграции от устья к верховью. Она очень медленно растёт и поздно становится половозрелыми — самки на 8-10 году жизни. Икра мелкая. Нельмы иногда скрещиваются с сигами. Они являются объектом промысла и разведения.

# ОСЁТР СИБИРСКИЙ





Смотрю на глобус – шар земной.  
И вдруг вздохнул он, как живой.  
И шепчут мне материки: “Ты  
береги, нас, береги”.

В тревоге рощи и леса, роса на  
травах, как слеза.

И тихо просят родники: “Ты  
береги нас, береги”.

Остановил олень свой бег: “Будь  
Человеком, человек.

В тебя мы верим, не солги, ты  
береги нас, береги”.

Грустит глубокая река, свои теряя  
берега.

И слышу голос я реки: “Ты береги  
нас, береги”.

Смотрю на глобус, шар земной,  
такой прекрасный и родной.

И шепчут губы: “Не солгу, я  
сберегу вас, сберегу”.

**Е. Шкловский**

