

# Урок по предмету окружающий мир: «В царстве грибов»



Выполнила: учитель начальных  
классов ГБОУСОШ № 62 Санкт-  
Петербурга

Михайлова Н.Н.

Проверила: Суханова К.Д.





Я под шапкою цветной  
На ноге стою одной,  
У меня свои повадки,  
Я всегда играю в  
прятки...



**Отгадай загадку**





Белый  
гриб

Мухомо  
р

Лисички



Бледная  
поганка

Подосиновик





Белый  
гриб

Мухомо  
р

Лисички



Бледная  
поганка

Подосиновик





Белый  
гриб

Лисички

Мухомо  
р



Бледная  
поганка

Подосиновик





Белый  
гриб

Мухомо  
р

Лисички



Бледная  
поганка

Подосиновик





Белый  
гриб

Мухомо  
р

Лисички



Бледная  
поганка

Подосиновик






# Определи части гриба

**НОЖКА**

**грибница**

**ШЛЯПКА**





Узнай грибы, распредели их по группам:

**ядовитые**

**съедобные**





# Найди названия съедобных грибов

Лисичка

Сыроежка

Бледная поганка

Белый гриб

Подосиновик

Мухомор





# Грибы Красной книги России



Трутовик листоватый



Гериций коралловый



Решеточник красный



Чешуйница древесинная



Трутовик разветвленный



Шишкогриб





**Трутовик листоватый**

Плодовое тело представлено многочисленными ветвящимися ножками, выходящими из общего основания. Поверхность шляпок с радиальными морщинками желто-серая или серовато-бурая. Мякоть мясистая, белая. Растет в основном у основания стволов бука, дуба, каштана. Хороший, съедобный гриб.







**Гериций коралловый**

Плодовое тело величиной до **40 см.** Ветви мясистые, сначала белые с розоватым оттенком, затем желтоватые, позднее буроватые, с густо расположенными шипами одного цвета с ветвями. Мякоть белая или желтоватая, немного волокнистая, без особого вкуса и запаха. Встречается в течение лета на пнях, валежнике лиственных деревьев, особенно березы. Гриб съедобен.







## Решеточник красный

Молодое тело гриба шаровидное или яйцевидное до **10** см высотой и **5** см шириной, белое, покрыто оболочками в **3** слоя. Наружный слой быстро разрывается звездообразными отгибающимися лопастями, сохраняющимися у основания гриба. С внутренней стороны это образование покрыто третьим слоем зеленовато-оливкового цвета, который быстро превращается в слизистую массу.







**Чешуйница древесинная**

Шляпка до **9** см в диаметре, рыже-бурая, сначала выпуклая, затем распростертая, чешуйчатая. Пластинки свободные, белые или белые с сероватым оттенком. Ножка одного цвета со шляпкой, чешуйчатая, к основанию сужена, полая. Мякоть беловатая, со слабым приятным запахом, без вкуса. Гриб несъедобный.







**Трутовик разветвленный**

Этот кустистый трутовик растет группами, достигающими в диаметре **40-50** см и состоящими из сотен экземпляров. Шляпки, довольно тонкие, но мясистые, сначала шаровидные, потом плоские с пуповидным углублением и маленьким бугорком в центре. Ножки тонкие, цилиндрические, мягкие. Поры мелкие, округлые или с острыми краями.







**Шишкогриб**

С чешуйчатой шляпкой, сетчато-орнаментированными, в массе буро-черными спорами наиболее распространен в умеренной полосе Европы, Азии и Северной Америки. Этот гриб растет в лиственных и смешанных лесах. В России встречается изредка на юге Дальнего Востока.

