



БОБРЫ - СТРОИТЕЛИ

МОУ Васильевская СШ
Учитель начальных
классов
Турова Н.Н.
2017 г



**Обыкновенный бобр, или речной бобр
(лат. *Castor fiber*) — полуводное
млекопитающее отряда грызунов.**



**Средней величины
околоводный зверь
(длина тела 75-120 см),
очень массивный, с
плоским
лопатообразным
хвостом, покрытым
роговыми щитками.
Глаза и уши
маленькие, между
пальцами задних лап
— плавательные
перепонки. Окраска
коричневая.**



В крутых берегах строят норы, а там, где берега плоские — хатки из скрепленных илом сучьев высотой до 3-5 м с подводным входом. В местах с непостоянным уровнем воды строят плотины из стволов и веток, скрепленных илом и глиной.



В случае опасности ныряют, подав сигнал тревоги — громкий шлепок хвостом по воде.



Зимой активность бобров резко снижается, и они значительную часть времени проводят в полусне — дреме.



Запасы на зиму

Бобры запасают ветки деревьев, которые складывают на дне водоема.



Следы бобров зимой



Для строительства и заготовки корма бобры валят деревья, подгрызая их у основания, отгрызают ветки, затем разделяют ствол на части. Ствол подгрызенного бобром дерева приобретает характерную форму «песочных часов».



Бобры превосходно плавают и ныряют. Большие лёгкие и печень обеспечивают им такие запасы воздуха и артериальной крови, что под водой бобры могут оставаться 10—15 минут, проплывая за это время до 750 м. На суше бобры довольно неуклюжи.



Детёныши у бобров появляются в апреле — мае. Они полузрячие, хорошо опушённые, весят в среднем 0,5 кг. Через 1—2 суток они уже могут плавать; мать обучает бобрят, буквально выталкивая их в подводный коридор. В возрасте 3—4 недель бобрята переходят на питание листьями и мягкими стеблями трав, но мать продолжает подкармливать их молоком до 3 месяцев.




Шестое чудо – бобрята.

Живут бобры семьями, супружеские пары образуются у них на всю жизнь.

Каждую весну появляются от 2 до 5 бобрят. Они живут с родителями два года и только на третьем году обзаводятся своими семьями.

Бобровая семья состоит из 8 -12 особей.



Бобры строго растительноядны. Питаются они корой и побегами деревьев, предпочитая осину, иву, тополь и берёзу, а также различными травянистыми растениями.



Столовая бобра. Дерево неподъемное, его не утащить. В эту столовую бобр приходит каждую ночь и обгрызает кору. Чтобы свалить дерево бобр вращается вокруг него, работая острыми резцами. Но больше подгрызается дерево с той стороны, в которую нужно уронить дерево. Опытные бобры обычно роняют деревья в воду.



Поваленные бобрами деревья служат кормом для зайцев и многих копытных, которые обгладывают кору со стволов и ветвей. Сок, вытекающий весной из подточенных деревьев, любят бабочки и муравьи, вслед за которыми появляются ПТИЦЫ.



Спасибо за внимание!



На следующем занятии: запасливый бурундук

