

Остановим туберкулёз вместе!

Подготовила:

учитель начальных классов Солнцевской ОШ 1-3 ст.


Буцкая Тамара Фёдоровна

Что такое туберкулёз?

Туберкулёз – это инфекционное заболевание.

Про это заболевание люди знали сотни лет.


Возбудитель заболевания – микобактерия туберкулёза или её еще называли палочкой Коха – по имени ученого, который первым её нашёл и изучил.



Генрих Герман
Роберт Кох

В природе существуют разные виды туберкулёзных бактерий:


Туберкулёз приводит к
заболеванию разных органов
человека, но чаще всего –
легких.



В чём опасность туберкулёза?

При отсутствии лечения каждый человек с активной формой туберкулёза инфицирует приблизительно, **10 – 15** человек в год.

Только общими усилиями можно остановить Туберкулёз!




Як розповсюджується туберкульоз?

Збудники туберкульозу розповсюджуються тільки повітряним шляхом. У повітрі бактерії туберкульозу попадають із легенів людей хворих на туберкульоз при кашлі, чиханні, гучній розмові. Зараження відбувається не у кожному разі, а тільки за наявності таких умов:

- Довгому або частому контакті з хворим на туберкульоз;
- Знаходженні у погано провітрюваних приміщеннях.

Повітря є єдиним для всіх людей, тому ніхто не захищений від ураження на туберкульоз.

Захворіти на туберкульоз можуть і дорослі, і діти. Особливо туберкульоз небезпечний для дітей і дорослих із слабкою імунною системою.



Що означає захворювання на

туберкульоз?

У хворого на туберкульоз спостерігають такі симптоми:

- Кашель протягом 2 – 3 тижнів;
- Біль у грудній клітці;
- Відділення мокроти чи кровохаркання;
- Слабкість;
- Втрата ваги тіла;
- Відсутність апетиту;
- Озноб, підвищення



Лечится ли туберкулёз ?

Туберкулёз лечится,
но для выздоровления надо:

- Пройти весь назначенный врачом курс на протяжении 6 – 8 месяцев;
- Принимать все назначенные лекарства под наблюдением врача.

**Все противотуберкулёзные
лекарства бесплатны
для больного!**



Что можно сделать для предупреждения туберкулёза?

Всем людям надо помнить:

Во время **кашля, чихания, зевания** рот и нос надо прикрывать платочком, чтобы уменьшить распространение источников заболевания.



Запомните:

Если вас беспокоит
кашель,
вы болеете
2 – 3 недели,
необходимо
немедленно
обратится к врачу-
терапевту.

