

«ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, НАСЕКОМЫЕ.

МБДОУ «Детский сад №2 р.п.Култук»

Дашиева Н,Н.

Озеро Байкал находится в довольно-таки холодном регионе России, несмотря

на это природа озера насыщена необычно – разнообразными его представителями.

В самом озере живёт более пятидесяти различных видов рыб нескольких семейств.

Прежде всего, это осетровые, лососевые, карповые, сомовые, тресковые и другие. Ещё в озере можно встретить единственного представителя млекопитающих – байкальского тюленя или нерпу.





Кроме омуля и двух видов голомянки в Байкале водятся 49 видов рыб, эндемичными являются 27 видов.

Семейство Осетровые представлено одним видом - байкальский осётр.

Семейство Лососевые, кроме омуля, представлено ещё четырьмя видами - даватчаном, тайменем, сигом, ленком.

Семейство Хариусовые представлено одним видом - сибирский хариус. В Байкале живут две его разновидности - черный хариус, который обитает преимущественно в южных и северных частях озера и белый хариус обитающий у восточного побережья.

Семейство Щуковые представлено одним видом - щука обыкновенная (на фото). Водится щука в заливах озера и реках впадающих в Байкал.



В народе Байкал славен, прежде всего, омулем. Байкальский омуль и для местных, и для приезжих является деликатесом, особенно в своем малосольном и горячее-копченом вариантах.



Голомянка обитает на большой глубине озера Байкал



Бычок байкальский




Окунь



Сибирская плотва, сорога




Налим



Амурский сазан



Обыкновенный таймень




Лещ




Байкальский сиг




Язь



Байкальский хариус



Ленок



Арктический голец



Ондатра



Белка



Кабарга - самый мелкий олень. Длина тела около 1 м, масса до 17 кг. Задние ноги значительно длиннее передних. Рогов нет, но у самцов имеются длинные, изогнутые клыки.

Живет в горной тайге, питается древесными и наземными лишайниками.



Косули встречаются в горных лесах. Окраска летом рыжая, зимой серая. Рога с тремя-четырьмя отростками бывают только у самцов. В октябре, после гона рога сбрасываются, с декабря начинают расти новые. Зимой косули держатся небольшими табунками. Питаются зимой корой и побегами кустарников, летом - травами.



Изюбрь

Встречается в Предбайкалье и в Присяянье, в горных таежных районах. В течение года совершают вертикальные кочевки: летом поднимаются до верхних пределов растительности, зимой спускаются в пониженные участки темнохвойной тайги.

Питается ветвями и корой деревьев, травой.




Волк



Соболь



На Байкале можно увидеть интереснейшего представителя животного мира, бурого медведя, который выходит к озеру ловить рыбу или просто попить ВОДЫ.



Заяц - русак



Лиса



Суслик



Бурундук



Ящерица



Дикий кабан



РЫСЬ





Птицы

- Вальдшнеп (лесной кулик).
- Серая куропатка.
- Орлан - белохвост.



Сизая чайка.

Птицы, обитающие по берегам Байкала и Ангары. В окраске оперения преобладают белые, серые и черные тона. Крылья у чаек длинные, приспособленные к длительному, маневренному полету. Хорошо плавают, могут нырять, падая в воду за добычей. Гнездятся, обычно, колониями на скалах или в зарослях водных растений.

В кладке 1-4 яйца, которые насиживают оба родителя. Птенцы вылупляются зрячими, опушенными, способными передвигаться по суше и еще лучше по воде. Родители выкармливают их до тех пор, пока они не научатся летать.

Питаются рыбой, яйцами и птенцами мелких птиц, мелкими грызунами, насекомыми.



Орёл - Беркут



Сова -сплюшка



Утка -шилохвост



Глухарь




Оляпка



Трясогузка



Голуби



Дятел



Серый снегирь



Свиристели





Тетерев







Саранча



Божья коровка



Клоп



Изумрудный демон



Моль



Клещ

бинт или вату, поместить завернутого клеща в банку или коробочку.



Внимание! При присасывании клеща необходимо обратиться к врачу, даже в случае благополучного удаления клеща с тела!

ИРКУТСК

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
АИСТ
WWW.AIST.RU



Паук



Пчеложук иркутский





Бабочки Красной книги

Категория I I



Махаон



Бражник мёртвая голова



Медведица Кайя



Павлиноглазка грушевая

Подура

Это насекомое известно еще и под названием ногохвостка. У него длинное тело белого или синего цвета с прыгательными конечностями. Длина тела обычно 1–2 мм. Обитает преимущественно в парниках. Подуры повреждают нежные листочки рассады томатов, капусты и огурцов. По мере взросления переходят на более грубые листья и скелетируют их. Благоприятным фактором для их развития и размножения является переувлажнение почвы.



Вредная долгоножка: Взрослые насекомые имеют вид крупного комара



Комар





Спасибо

за

внимание!