

ДРОФА И СТРЕПЕТ, занесённые в Красную книгу Саратовской области.

Учебная презентация учащихся 4 класса
МОУ «СОШ с.Багаевка»: Михеева
Сергея, Яценко Богдана




ДРОФА



- Саратовская область - второе в мире местожительство по величине популяции дроф. Это значит, что мы несём большую ответственность за сохранение этой птицы.
- «Основная площадь ключевой орнитологической территории России находится в пределах существующего федерального зоологического заказника «Саратовский».

ЗАКАЗНИК «САРАТОВСКИЙ»



- С целью сохранения на территории Фёдоровского района дрофы в 1983 году создан Федеральный заказник «Саратовский» (иное название «Семёновский») расположенный вблизи села Борисоглебовка.
- В 1998 г. к территории было решено присоединить прилегающие земли Краснокутского и Питерского районов, где дрофы также есть.

ВЫВЕДЕНИЕ ПОТОМСТВА



- Самка дрофы достигает зрелости в 4-5 лет. Обязанность выведения потомства лежит полностью на ней. Первые кладки отмечаются в конце апреля – первой половине мая



- Кладку из 2 - 3 яиц насиживает самка 21 - 28 суток. Птенцы вылупляются в конце мая - начале июня, на крыло поднимаются через 35 дней.

ЧЕМ ПИТАЮТСЯ?

- Птенцы держатся всю зиму с матерью. Кормятся в основном утром и вечером, питание смешанное.
- Среди животной пищи преобладают жуки и прямокрылые. Ловят мелких грызунов и ящериц. Зимой кормятся семенами и всходами озимых. Регулярно пользуются водопоями, заглатывают гастролиты.

КАК ВЫГЛЯДЯТ ГНЁЗДА?

- Гнездо представляет собой ямку в земле, иногда со скудной выстилкой. 50 % зарегистрированных гнёзд дрофы располагались на земле, на просторных просяных полях.

Жизнь самца дрофы.



- В конце марта – начале апреля, сразу же после прилёта, начинается период токования. После этого кратковременного периода самцы собираются отдельными группами и «фланируют» по окрестностям до следующего брачного периода.

СТРЕПЕТ



- **СТРЕПЕТ** - птица небольших размеров, примерно с тетерева: весит от 600 до 950 г. По общему облику стрепет весьма напоминает дрофу. Ведет наземный образ жизни, быстро бегают по земле.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ.

- Прежде гнездовой ареал охватывал заволжские и правобережные районы. Территорией Саратовской губернии ограничивалось распространение вида на севере, однако уже в конце XIX, к середине XX века вследствие распашки земель он был полностью вытеснен из северных районов области.

- Наиболее крупные остаточные очаги распространения сохранились в Ровенском, Энгельсском, Краснокутском, Озинском и Александрово-Гайском районах.
- На рубеже столетий в связи с увеличением залежных земель, наблюдалось увеличение численности и расширение распространения птиц в правобережных районах-Аткарском, Воскресенском, Саратовском и Татишевском районах области.

Образ жизни.



- Большинство птиц приступают к токованию в первой декаде мая. Самки устраивают гнёзда обычно со второй половины мая по первую половину июня.

- Гнёзда представляют собой углубления в субстрате и обычно выстланы растительной ветошью.
- Кладки яиц отмечаются с середины мая, они содержат 2-5, в среднем 3-4 яйца. Насиживает кладку самка 22-26 дней. Вылупление птенцов- последняя декада мая- первые числа июня.
- Средняя продолжительность пребывания стрепетов в области- 208 дней.