


Язь

Белорусское название — язь
Местные названия – вязь, белизна,
подъязык

Рыба семейства карповых. Длина до 70 см, масса до 8 кг. Тело сжатое с боков. Спинной и анальный плавники усечены. В спинном плавнике 3 неветвистых и 7-9 ветвистых лучей, в анальном соответственно 3 и 9-11. Чешуя мелкая. В боковой линии 53-64 чешуйки. Голова относительно короткая, лоб широкий, выпуклый. Глаза зеленовато-жёлтые с тёмным пятном наверху. Рот нижний. Глоточные зубы цилиндрические, двухрядные.



Местообитание язя


Язь населяет водоёмы Средней Европы и Сибири вплоть до Колымы. В бассейне Аральского моря он представлен особым подвидом — туркестанским язем.

Обычные места обитания — реки равнинного типа с чистой водой и небыстрым течением. В Беларуси эта рыба широко распространена почти во всех значительных реках, проточных озёрах и водохранилищах и избегает лишь рек с холодной водой и верховьев с быстрым течением.



Описание

Неопытный рыбак может легко спутать язя с голавлем или плотвой. Но внимательно присмотревшись, его можно отличить от плотвы по более мелкой чешуе и зеленовато-жёлтой радужине глаз, от голавля — по более высокому телу, относительно короткой голове, малиново-красным брюшным и анальным плавникам. Общая окраска язя темноватая, с небольшим золотистым оттенком. Спина и верхняя часть боков тёмно-синяя, нижняя часть белесоватая, брюхо серебристое, спинной и хвостовой плавники тёмные, изредка красноватые.



Размножение

Половозрелым язь становится на 4-5-м году жизни при длине тела около 25 см. Нерест у него очень ранний, сразу же после щуки, когда температура воды поднимается до $5,5^{\circ}\text{C}$, что в условиях Беларуси обычно бывает в конце марта — начале апреля. Единовременное икрометание заканчивается довольно быстро в 2—3 дня, однако резкая перемена температуры воды может значительно замедлять этот процесс.



Размножение

Для нереста язь выходит на разливы, протоки, перекаты с подводными камнями, пнями, корягами и т. д. Икра желтоватого цвета, ее трудно отличить от икры других карповых рыб. Плодовитость язя большая и колеблется от 42 до 150 тысяч икринок. Личинки выклеваются через 7-10 дней в зависимости от температуры воды.



Личинки

Первые дни личинки держатся в местах выклева, прикрепляясь к подводным предметам помощью так называемых цементных желез, а примерно через неделю переходят в более тихие и безопасные места, к берегам и держатся на слабом течении.



Питание

Пища язя весьма разнообразна, он в принципе всеяден. Молодь питается зоопланктоном и водорослями, взрослые рыбы наряду с высшей растительностью, моллюсками, насекомыми поедают также мальков рыб всех видов



Значение

Язь имеет довольно существенное промысловое значение. Его мясо очень питательно и в этом отношении может конкурировать с мясом карпа. Более того, в сравнении с ним в теле язя больше съедобных частей, а мясо богаче белком

