

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЛЯТИВИСТСКИХ  
ПРИНЦИПОВ ПРИ РЕШЕНИИ  
ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ  
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Кенжаев Зафар Муродуллаевич

МБОУ СОШ с.Константиновка

**Задача 1.** Ускоритель сообщил радиоактивному ядру скорость  $0,4c$ , где  $c$  – скорость света в вакууме. В момент вылета из ускорителя ядро выбросило в направлении своего движения  $\beta$  - частицу со скоростью  $0,75c$  относительно ускорителя. Определите скорость частицы относительно ядра. Ответ представьте в мегаметрах за секунду.

<b>Дано:</b>	<b>Решение:</b>
$v = 0,4c$ $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$ $v_x = 0,75c$	<p data-bbox="697 544 1825 686">Используем релятивистский закон сложения скоростей.</p> $v_x = \frac{v_{x'} + v}{1 + \frac{v_{x'} \cdot v}{c^2}}$
$v_{x'} = ?$	

Здесь  $v_x$  – скорость  $\beta$  - частицы в системе отсчета, связанной с ускорителем;  $v_{x'}$  – скорость  $\beta$  - частицы в системе отсчета, связанной с ядром;  $v$  – скорость инерциальной системы, связанной с ядром, относительно системы отсчета, связанной с ускорителем.

Тогда скорость частицы относительно ядра

$$v_{x'} = \frac{v_x - v}{1 - \frac{v_x \cdot v}{c^2}}$$

$$v_{x'} = \frac{0,75c - 0,4c}{1 - \frac{0,75c \cdot 0,4c}{c^2}} = \frac{c}{2} = 1,5 \cdot 10^8 \text{ (м/с)} = 150 \text{ (Мм/с)}$$

**Ответ:**  $v_{x'} = 150 \text{ Мм/с}$

**Задача 2.** Собственное время жизни некоторой нестабильной частицы 10 нс. Найдите путь, пройденный этой частицей до распада в неподвижной системе отсчета, если её время жизни в ней 20 нс. Ответ представьте в единицах СИ и округлите до десятых.

<b>Дано:</b>	<b>Решение:</b>
$\tau_0 = 10 \text{ нс} = 10^{-8} \text{ с}$ $\tau = 20 \text{ нс} = 2 \cdot 10^{-8} \text{ с}$ $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$	<p>Путь, пройденный частицей до распада в неподвижной системе отсчета</p> $S = v\tau.$
$S = ?$	$\tau$ и $\tau_0$ связаны соотношением

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Выразим отсюда скорость с которой движется частица.

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{\tau_0}{\tau}\right)^2}.$$

$$S = v\tau = c \sqrt{1 - \left(\frac{\tau_0}{\tau}\right)^2} \cdot \tau.$$

Подставим численные значения.

$$S = 3 \cdot 10^8 \sqrt{1 - \left(\frac{10^{-8}}{2 \cdot 10^{-8}}\right)^2} \cdot 2 \cdot 10^{-8} = 5,2 \text{ (м)}.$$

**Ответ:**  $S = 5,2 \text{ м}$

Задача 3. Энергия покоя электрона 0,51 МэВ ( $1 \text{ МэВ} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ Дж}$ ). Какова скорость электрона после сообщения ему энергии 1 МэВ в ускорителе? Результат представьте в гигаметрах за секунду ( $1 \text{ Гм/с} = 10^9 \text{ м/с}$ ) и округлите до сотых. Скорость света в вакууме  $3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$ .

Дано:

Решение:

$$E_0 = 0,51 \text{ МэВ}$$

$$E_k = 1 \text{ МэВ}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$$1 \text{ МэВ} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ Дж}$$

$$1 \text{ Гм/с} = 10^9 \text{ м/с}$$

$$v = ?$$

энергия покоя

Электрон в ускорителе приобретает кинетическую энергию, которую можно определить как разность между полной энергией и энергией покоя

$$E_k = E - E_0.$$

Полная энергия

$$E = mc^2,$$

$$E_0 = m_0c^2.$$

Масса релятивистской частицы и ее масса покоя связаны соотношением:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

Тогда

$$\begin{aligned} E_k &= mc^2 - m_0c^2 = c^2(m - m_0) = \\ &= c^2\left(\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0\right) = E_0\left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1\right) \end{aligned}$$

После математических преобразований находим скорость электрона

$$\begin{aligned} v &= c \sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E_0 + E_k}\right)^2} \\ v &= 3 \cdot 10^8 \sqrt{1 - \left(\frac{0,51}{0,51 + 1}\right)^2} = 2,82 \cdot 10^8 \text{ (м/с)} = 0,28 \text{ (ГМ/с)} \end{aligned}$$

**Ответ:**  $v = 0,28 \text{ ГМ/с}$