

Депобразования и молодежи Югры
бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Мегионский политехнический колледж»
(БУ «Мегионский политехнический колледж»)



Тема урока по физике: «Радиоволны»

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
21.02.01 «Работка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений».

Преподаватель физики: Магомедов Абдул
Маграмович

Мегион, 2020

Презентация по физике

на тему:

Радиоволны

Пла


1. Значение радиоволн для физики и человечества
2. Распространение радиоволн, диапазон длин и частот; динамический диапазон
3. Источники
4. Области применения радиоволн
5. Влияние радиоволн на

**Открытие радиоволн
дало человечеству
массу возможностей
, среди которых
радио, телевидение,
радары,
радиотелескопы и
беспроводные
средства связи. С
помощью радио
люди всегда могут
попросить помощи у
спасателей, корабли
и самолёты подать
сигнал бедствия, и
можно узнать**



**Радиоволны
переносят через
пространство
энергию,
излучаемую
генератором
электромагнитных
колебаний. А
рождаются они при
изменении
электрического поля,
например, когда
через проводник
проходит
переменный
электрический ток**





ДИАПАЗОН	ДЛИНА ВОЛНЫ В ВАКУУМЕ	ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ
СВЕРХДЛИННЫЕ ВОЛНЫ (СДВ)	100-10 КМ	3-30 кГц
ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ (ДВ)	10 - 1 КМ	30-300 кГц
СРЕДНИЕ ВОЛНЫ (СВ)	1000 – 100 М	300 – 3000 кГц
КОРОТКИЕ ВОЛНЫ (КВ)	100 – 10 М	3 – 30 МГц
УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ (УКВ):		
МЕТРОВЫЕ	10 – 1 М	30 – 300 МГц
ДЕЦИМЕТРОВЫЕ	10 – 1 ДМ	300 – 3000 МГц
САНТИМЕТРОВЫЕ	10 – 1 СМ	3-30 ГГц
МИЛЛИМЕТРОВЫЕ	10 – 1 ММ	30 – 300 ГГц
СУБМИЛЛИМЕТРОВЫЕ	1 – 0,05 ММ	300 – 6000 ГГц

Динамический диапазон* - разность между максимальным и минимальным значениями уровней сигналов, при которых еще не наблюдается искажений (из-за нелинейности усилительного тракта рассматриваемого устройства). Чем шире ДД, тем более сильные сигналы способно принимать устройство без искажений.



Источники:

- 1) Радиоизлучение Солнца
- 2) Галактические радиоисточники
- 3) Фоновое излучение
- 4) Радиоизлучение планет
- 5) Излучение водород



В 1956 К.Мейер из Военно-морской лаборатории США открыл излучение Венеры на волне 3 см. В 1955 Б.Бурке и К.Франклин из института Карнеги в Вашингтоне обнаружили короткие радиоволны, исходящие от Юпитера



Нейтральный атомарный водород –
возможно, самый распространенный
элемент в межзвездном
пространстве. Он способен излучать
радиолинию с длиной волны *21 см*,
которая была предсказана в *1944*
нидерландским теоретиком Х. ван де
Хюлстом и обнаружена в *1951* Х.

дом из Гарвардского



В 1899 году была обнаружена возможность приёма сигналов с помощью телефона. В начале 1900 года радиосвязь была успешно использована во время спасательных работ в Финском заливе. При участии Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и в армии России.


Важнейшим этапом развития

Области

- 1) Медицина (косметология, хирургия)
- 2) Радиометеорология
- 3) Радиолокация
- 4) Беспроводная связь
- 5) Научные (космические) исследования



Сургитрон



Влияние

радиоволн

В жилых помещениях достаточно грамотно расположить бытовые приборы: в их поле не должны попадать кровать и диваны, обеденный стол, то есть те места, где мы проводим много времени. Это самый простой способ свести к минимуму воздействие излучения.



Мобильные телефоны – источник излучения, которого нам никак не избежать. Мы держим их возле головы и позволяем излучению воздействовать на мозг. В качестве мер предосторожности можно предложить носить телефон в сумке, а не в кармане. А при долгих разговорах не держать телефон около уха, а положить его на стол, при этом использовать гарнитуру.

