

Автор: учитель физики Стрельцова С. Д.  
МБОУ Новомеловатская СОШ, Калачеевского района

A vibrant cosmic background featuring a large blue and white galaxy in the center, surrounded by smaller galaxies and numerous stars. Several planets and moons are visible, including a large blue planet with white clouds and a smaller brown planet with a dark surface. The overall scene is set against a dark, star-filled space.

# Закон всепмирного тяготения

(Физика 9 класс)

# Как был открыт закон всемирного тяготения.

## Из истории физики...



· Датский астроном Тихо Браге (1546-1601), долгие годы наблюдавший за движением планет, накопил огромное количество интересных данных, но не сумел их обработать.




· Иоганн Кеплер (1571-1630) используя идею Коперника о гелиоцентрической системе и результаты наблюдений Тихо Браге, установил законы движения планет вокруг Солнца, однако и он не смог объяснить динамику этого движения.



· Исаак Ньютон открыл этот закон в возрасте 23 лет, но целых 9 лет не публиковал его, так как имевшиеся тогда неверные данные о расстоянии между Землей и Луной не подтверждали его идею. Лишь в 1667 году, после уточнения этого расстояния, *закон всемирного тяготения* был наконец отдан в печать.

# Как был открыт закон всемирного тяготения.



Ньютон предположил, что ряд явлений, казалось бы не имеющих ничего общего (падение тел на Землю, обращение планет вокруг Солнца, движение Луны вокруг Земли, приливы и отливы и т. д.), вызваны одной причиной.

Окинув единым мысленным взором «земное» и «небесное», Ньютон предположил, что существует единый закон всемирного тяготения, которому подвластны все тела во Вселенной — от яблок до планет!

В 1667 г. Ньютон высказал предположение, что между всеми телами действуют силы взаимного притяжения, которые он назвал силами всемирного тяготения.


Исаак Ньютон - английский физик и математик, создатель теории гравитации в механике и астрономии. Он открыл закон всемирного тяготения, разработал дифференциальное исчисления, изобрел зеркальный телескоп и был автором многих других важнейших экспериментальных работ по оптике. Его праву считают создателем "классической механики".



В 1687 г. Ньютон установил один из фундаментальных законов механики, получивший название закона всемирного тяготения:

*Два любых тела притягиваются друг к другу с силой, модуль которой прямо пропорционален произведению их масс и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними,*

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



где  $m_1$  и  $m_2$  – массы взаимодействующих тел,  $r$  – расстояние между телами,  $G$  – коэффициент пропорциональности, одинаковый для всех тел в природе и называемый постоянной всемирного тяготения или гравитационной постоянной.

## Запомни, что ...

**Гравитационное взаимодействие** — это взаимодействие, свойственное всем телам Вселенной и проявляющееся в их взаимном притяжении друг к другу.

**Гравитационное поле** — особый вид материи, осуществляющее гравитационное взаимодействие.

# Механизм гравитационного взаимодействия

В настоящее время механизм гравитационного взаимодействия представляется следующим образом.


Каждое тело массой  $M$  создает вокруг себя поле, которое называют гравитационным.

Если в некоторую точку этого поля поместить пробное тело массой  $m$ , то гравитационное поле действует на данное тело с силой  $F$ , зависящей от свойств поля в этой точке и от величины массы пробного тела.

# Эксперимент Генри Кавендиша по определению гравитационной постоянной.

Английский физик Генри Кавендиш определил, насколько велика сила притяжения между двумя объектами. В результате была достаточно точно определена гравитационная постоянная, что позволило Кавендишу впервые определить и массу Земли.

Экспериментальное определение значения гравитационной постоянной.



*Жми сюда*



*Flash-ролики*



G - гравитационная постоянная, она численно равна силе гравитационного притяжения двух тел, массой по 1 кг. Каждое, находящихся на расстоянии 1 м одно от другого.

G - универсальная  
гравитационная постоянная равна  
 $G=6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н м}^2 / \text{кг}^2$

Сила взаимного притяжения всегда направлена вдоль прямой, соединяющей тела.

# Вращение планет вокруг Солнца




# Границы применимости закона

Закон всемирного тяготения имеет определенные границы применимости; он применим для:

- 1) материальных точек;
- 2) тел, имеющих форму шара;
- 3) шара большого радиуса, взаимодействующего с телами, размеры которых много меньше размеров шара.

Закон неприменим, например, для взаимодействия бесконечного стержня и шара.

Сила тяготения очень мала и становится заметной только тогда, когда хотя бы одно из взаимодействующих тел имеет очень большую массу (планета, звезда).



# Подумай и ответь. *Закрепление (фронтальная беседа)*

## *Группа А*

1. Почему Луна не падает на Землю?
2. Почему мы замечаем силу притяжения всех тел к Земле, но не замечаем взаимного притяжения между самими этими телами?
3. Как двигались бы планеты, если бы сила притяжения Солнца внезапно исчезла?
4. Как двигалась бы Луна, если бы она остановилась на орбите?
5. Притягивает ли Землю стоящий на ее поверхности человек? Летящий самолет? Космонавт, находящийся на орбитальной станции?

# Подумай и ответь. *Закрепление (фронтальная беседа)*

## *Группа Б.*

1. Некоторые тела (воздушные шары, дым, самолеты, птицы) поднимаются вверх, несмотря на тяготение. Как вы думаете, почему? Нет ли здесь нарушения закона всемирного тяготения?
2. Что нужно сделать, чтобы увеличить силу тяготения между двумя телами?
3. Какая сила вызывает приливы и отливы в морях и океанах Земли?
4. Почему мы не замечаем гравитационного притяжения между окружающими нас телами?

## Расчётные задачи (самостоятельно)

1. Космический корабль массой 8 т приблизился к орбитальной космической станции массой 20 т на расстояние 500 м. Найдите силу их взаимного притяжения.
2. На каком расстоянии сила притяжения между двумя телами массой по 1000 кг каждое будет равна  $6,67 \cdot 10^9$  Н?
3. Два одинаковых шарика находятся на расстоянии 0,1 м друг от друга и притягиваются с силой  $6,67 \cdot 10^{-15}$  Н. Какова масса каждого шарика?

# Вопрос-ответ (устно)

Составьте вопросы и затем дайте ответ к рисункам 1-4.

**1**


$$F = G \frac{M_s m}{R_s^2}$$

**2**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОСТОЯННОЙ

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$


СХЕМА ОПЫТА

$$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Нм}^2}{\text{кг}^2}$$

**3**


$$F \neq G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

**4**

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛИВОВ



Луна

ПРИЛИВ

Земля

ПРИЛИВ

# Рефлексия

## Заполнение концептуальной таблицы

*(работа с таблицей)*

Фамилия, Имя	Что знал?	Что узнал?	С чем не согласен?	Что непонятно?

Обмен мнениями, цитаты из таблиц с рефлексией.  
Подведение итогов урока.



Автор: учитель физики и информатики Александрова З.В.,  
МОУ СОШ №5 п. Печенга, Мурманская область, 2008 г

**Д/З : п.15, упр.15 (1,2,3),**

физика 9 кл, А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, Дрофа 2006г., М.

**Спасибо за внимание.  
Спасибо за урок.**

Используемые ресурсы:

<http://n-t.ru/tp/iz/uzn.htm>

<http://www.ido.rudn.ru/nfpk/fizika/dinamika/2.htm>

!

<http://www.hde.kurganobl.ru>

<http://www.fizika.ru/didakt/testy/index.htm>

<http://www.home-edu.ru>

<http://www.cosmoportal.org.ua>