

Этапы развития физики элементарных частиц

Физика, 11 класс

1 этап.

От электрона до позитрона (1897-1932 г. г.)

- Элементарные частицы – «атомы Демокрита» на более глубоком уровне.

Открытие электрона



Д.Д. Томсон

С 1895 г. Джозеф Джон Томсон в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета начинает методическое количественное изучение отклонения катодных лучей в электрических и магнитных полях. Итоги этой работы были опубликованы в 1897 г. в октябрьском номере журнала "Philosophical Magazine". Томсон доказал, что все частицы, образующие катодные лучи, тождественны друг другу и входят в состав вещества. Суть опытов и гипотезу о существовании материи в состоянии еще более тонкого дробления чем атомы, Томсон изложил на заседании Королевского общества 29.04.1897 г. Извлечение из этого сообщения было опубликовано в "Electrician" 21.05.1897 г.

2 этап.

От позитрона до кварков (1932-1964 г.г.)

- Все элементарные частицы превращаются друг в друга.

Реакции получения элементарных частиц



На рисунке показан результат столкновения ядра углерода, имевшего энергию 60 млрд эВ (жирная верхняя линия), с ядром серебра фотоэмульсии. Ядро раскалывается на осколки, разлетающиеся в разные стороны. Одновременно рождается много новых элементарных частиц – пионов.

Все элементарные частицы превращаются друг в друга, и эти взаимные превращения – главный факт их существования.

Реакции получения элементарных частиц



А.М. Балдин
(1926-2001)

Подобные реакции при столкновениях релятивистских ядер, полученных в ускорителе, впервые в мире осуществлены в лаборатории высоких энергий Объединённого института ядерных исследований в г. Дубне, под руководством академика Александра Михайловича Балдина. Лишённые электронной оболочки ядра были получены путём ионизации атомов углерода лазерным лучом.


3 этап. От гипотезы о кварках до наших дней

(1964-1995 г.г.)

- Большинство элементарных частиц имеет сложную структуру.


Кварки – первичные частицы

- В 1964 г. Мюрреем Гелл-Манном и Дж. Цвейгом была предложена модель, согласно которой все частицы, участвующие в сильных (ядерных) взаимодействиях, - адроны – построены из более фундаментальных (или первичных) ч



Нейтрон, состоящий из трёх кварков: $u (+2e/3)$, $d (-e/3)$, $d (-e/3)$

Авторы кварковой модели



М. Гелл-Манн



Дж. Цвейг

Кварки

Название частицы (Аромат)	Обозначение	Цвет (голубой, зеленый, красный)	Масса покоя, МэВ	Эл. заряд
Up (Верхний)	u	u_r u_z $u_{кр}$	310	+2/3
Down (Нижний)	d	d_r d_z $d_{кр}$	310	-1/3
Charm (Очарованный)	c	c_r c_z $c_{кр}$	1500	+2/3
Strange (Странный)	s	s_r s_z $s_{кр}$	505	-1/3
Top Truth (Истинный)	t	t_r t_z $t_{кр}$	(Гипотетическая частица), >2250 0 около 5000	+2/3
Bottom beauty (Красивый)	b	b_r b_z $b_{кр}$		-1/3

Группа	Название частицы	Символ		Масса (в электронных массах)	Электрический заряд	Спин	Время жизни (с)	
		Частица	Античастица					
Фотоны	Фотон	γ		0	0	1	Стабилен	
Лептоны	Нейтрино электронное	ν_e	$\bar{\nu}_e$	0	0	1/2	Стабильно	
	Нейтрино мюонное	ν_μ	$\bar{\nu}_\mu$	0	0	1/2	Стабильно	
	Электрон	e^-	e^+	1	-1 1	1/2	Стабилен	
	Мю-мезон	μ^-	μ^+	206,8	-1 1	1/2	$2,2 \cdot 10^{-6}$	
Адроны	Мезоны	π^0		264,1	0	0	$0,87 \cdot 10^{-16}$	
		Пи-мезоны	π^+	π^-	273,1	1 -1	0	$2,6 \cdot 10^{-8}$
		К-мезоны	K^+	K^-	966,4	1 -1	0	$1,24 \cdot 10^{-8}$
			K^0	\bar{K}^0	974,1	0	0	$\approx 10^{-10} - 10^{-8}$
	Эта-нуль-мезон	η^0		1074	0	0	$\approx 10^{-18}$	
	Барiony	Протон	p	\bar{p}	1836,1	1 -1	1/2	Стабилен
		Нейтрон	n	\bar{n}	1838,6	0	1/2	898
		Лямбда-гиперон	Λ^0	$\bar{\Lambda}^0$	2183,1	0	1/2	$2,63 \cdot 10^{-10}$
		Сигма-гипероны	Σ^+	$\bar{\Sigma}^+$	2327,6	1 -1	1/2	$0,8 \cdot 10^{-10}$
			Σ^0	$\bar{\Sigma}^0$	2333,6	0	1/2	$7,4 \cdot 10^{-20}$
			Σ^-	$\bar{\Sigma}^-$	2343,1	-1 1	1/2	$1,48 \cdot 10^{-10}$
		Кси-гипероны	Ξ^0	$\bar{\Xi}^0$	2572,8	0	1/2	$2,9 \cdot 10^{-10}$
			Ξ^-	$\bar{\Xi}^-$	2585,6	-1 1	1/2	$1,64 \cdot 10^{-10}$
	Омега-минус-гиперон	Ω^-	$\bar{\Omega}^-$	3273	-1 1	1/2	$0,82 \cdot 10^{-11}$	

**Таблица
элементарны
Х
частиц**

Список использованных источников

- <http://to-name.ru/biography/dzhozef-tomson.htm>
- <http://nuclphys.sinp.msu.ru/introduction/xx5.htm>
- <http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=210>
- http://www.limm.mgimo.ru/science/lect_4.html
- <http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph9/theory.html>
- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007.