

Равномерное движение точки по окружности.

Ответить на вопросы

Какое движение называют свободным падением?

Что доказывает опыт с трубкой Ньютона?



Чему равно численное значение ускорения свободного падения?

По каким формулам можно определить скорость и перемещение при свободном падении?

Решение задач

1. Какую начальную скорость надо сообщить камню при бросании его вертикально вниз с моста высотой 20 м, чтобы он достиг поверхности воды через 1 с?
2. В трубке с воздухом при атмосферном давлении на одной и той же высоте находятся дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел быстрее достигнет дна трубки при падении?
 - а) дробинка
 - б) пробка
 - в) птичье перо
 - г) все тела достигнут дна одновременно.

Примеры:






Рис. 38





Рис. 36

Мгновенная скорость тела в любой точке траектории направлена по касательной к траектории в этой точке.





При криволинейном движении меняется:

- 1). Координаты X и Y .
- 2). Направление движение.
- 3). Направление и модуль скорости и ускорения.

Криволинейное движение – это всегда движение с ускорением, даже если по модулю скорость не меняется.

Любую кривую можно всегда представить как совокупность дуг окружностей различных радиусов.





В любой точке траектории:


$$\vec{a}_c \perp \vec{v}$$



При равномерном движении по окружности его ускорение во всех точках окружности устремлено к центру – **центростремительное ускорение.**

\vec{a}_c - центростремительное ускорение

Найдём модуль ускорения:



Рассмотрим $\triangle AOB$ и $\triangle AMN$

$\triangle AOB$ – равнобедренный, т.к. $OA=OB=R$

$\triangle AMN$ – равнобедренный, т.к. $v_0 = v$

$\angle AOB = \angle MAN$, т.к. они образованы взаимно \perp сторонами: $v_0 \perp OA$ $v \perp OB$


$\Rightarrow \triangle AOB$ подобен $\triangle AMN \Rightarrow \frac{\Delta v}{AB} = \frac{v}{R}$ но т.к. $AB = l = vt$

$$\frac{\Delta v}{vt} = \frac{v}{R} \quad \text{или} \quad \frac{\Delta v}{t} = \frac{v^2}{R} \quad \Rightarrow \quad a_{\text{ц}} = \frac{v^2}{R}$$

Т. к. $v = \text{const}$ и $R = \text{const}$ то $a = \text{const}$

Механическое движение


Прямолинейное
(Траектория – прямая)



Условие прямолинейного движения:


Скорость тела и действующая на тело сила направлена вдоль одной прямой.

Криволинейное
(Траектория – кривая)




Условие криволинейного движения:

Скорость и действующая на тело сила, должны быть направлены вдоль пересекающихся прямых.

По II З.Н. $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \Rightarrow$ 

Сила, под действием которой тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью в каждой точке направлена по радиусу к центру окружности – **сила центростремительная.**

$$F_{ц} = ma = \frac{v^2 m}{R}$$


$$F_{ц} = \frac{v^2 m}{R}$$

Центростремительная
сила

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Угловое перемещение φ
2. Период обращения T
3. Частота обращения ν
4. Линейная скорость v
5. Угловая скорость (циклическая частота). ω
6. Центробежное ускорение

Закрепление пройденного:

- 1) С какой линейной скоростью волк бросил шляпу, если 14 витков веревки радиусом 0,2 м размотались за 2 секунды?
- 2) С какой линейной скоростью должна скакать лошадь, чтобы один круг по арене диаметром 13 м она проскакала за 9,8 секунды?
- 3) С какой минимальной скоростью должен двигаться самолет аттракциона, чтобы центробежная сила еще удерживала зайца в кабине? Самолет движется по окружности радиусом 10 м.