

# ***КИНЕМАТИКА***

**Курс подготовки к Единому  
государственному экзамену**

Учитель: Ланских Е.Ю.  
МОУ «Т-С СОШ № 2»

# Цель: повторение основных понятий кинематики, видов движения, графиков и формул кинематики в соответствии с кодификатором ЕГЭ.

## Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2011:

- Механическое движение и его виды;
- Скорость;
- Ускорение
- Уравнения прямолинейного равноускоренного движения;
- Свободное падение
- Относительность механического движения
- Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центробежное ускорение

# Основные понятия кинематики

- **Механическое движение тела**
  - изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.
- **Материальная точка**
  - тело, размерами которого в данных условиях можно пренебречь.
- **Траектория**
  - линия, которую описывает тело (материальная точка) при своем движении. В зависимости от точки траектории различают прямолинейное и криволинейное движение.

# Основные понятия кинематики



Пройденный путь и вектор перемещения при криволинейном движении тела.  
 $a$  и  $b$  – начальная и конечная точки пути

- **Перемещение**  $S$   
вектор, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением.
- **Пройденный путь**  $l$   
длина траектории, пройденной телом за некоторое время  $t$ .


# СКОРОСТЬ

## Мгновенной скоростью


поступательного движения тела в момент времени  $t$  называется отношение очень малого перемещения  $\Delta s$  к малому промежутку времени  $\Delta t$ , за который произошло это перемещение:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$


При криволинейном движении вектор скорости лежит на касательной к траектории движения тела и направлен в сторону движения тела.



## Прямолинейное **равномерное** движение



## Прямолинейное **равноускоренное** движение



Закон прямолинейного **равномерного** движения

$$x = x_0 + v_x t$$

Закон прямолинейного **равноускоренного** движения

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$


# ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ

# УСКОРЕНИЕ


векторная величина, равная отношению малого изменения вектора скорости к малому промежутку времени, в течение которого это изменение произошло.

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Прямолинейное **равномерное**  
движение




Прямолинейное **равноускоренное**  
движение



## ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ

## Прямолинейное **равномерное** движение


### ● СКОРОСТЬ



$v_1$  и  $v_2$  -  
противоположно  
направлены

## Прямолинейное **равноускоренное** движение

### ● СКОРОСТЬ




тем больше угол  
наклона прямой  
скорости, тем  
больше ускорение

тела


# ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ



- По графику скорости можно найти перемещение тела. Оно численно равно площади фигуры под графиком




**Прямолинейное  
равномерное движение**



**Прямолинейное  
равноускоренное движение**


# Свободное падение.



- *Свободным падением* называется движение тела под действием силы тяжести.
- *Ускорение свободного падения* при малых высотах над поверхностью Земли ( $h \ll R_3$ ) считается постоянным  $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ , поэтому свободное падение является равноускоренным движением и для него справедливы все формулы равноускоренного движения с заменой ускорения  $a$  на  $g$ .

# Равномерное движение по окружности

$$a = \frac{v^2}{R}$$



**Ускорение  $a$**   
(центростремительное)  
направлено к центру

**Скорость (линейная)**  
направлена по  
касательной к  
окружности

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi Rn$$

где  $n = 1/T$  – число оборотов тела за единицу времени или частота вращения


# Равномерное движение по окружности

- *Угловой скоростью* называется физическая величина, равная отношению угла поворота к интервалу времени, в течение которого этот поворот совершен:


$$\omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi n$$

- Угловая скорость выражается в рад/с.
- Связь между линейными и угловыми величинами:  $v = \omega R$        $a = \omega R^2$

В общем случае *криволинейного движения* вектор ускорения  $\vec{a}$  представляют в виде двух составляющих, одна направлена по касательной к траектории и называется тангенциальным ускорением  $\vec{a}_\tau$  и вторая по нормали (по радиусу к центру окружности) – это центростремительная или нормальная часть ускорения  $\vec{a}_n$ .  
 Модуль полного ускорения равен  $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$




# Криволинейное движение тел с ускорением свободного падения.



Тело одновременно участвует в двух движениях: равномерном прямолинейном по горизонтали вдоль оси  $OX$  и сначала – в равнозамедленном движении вверх с убывающей по модулю скоростью до высшей точки подъема, а затем в свободном падении вниз без начальной скорости вдоль оси  $OY$ .

# Криволинейное движение тел с ускорением свободного падения.



$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$

$$v_x = v_{0x}$$

$$t_{\text{взлета}} = t_{\text{падения}}$$


$$x = v_x t = v_0 t \cos \alpha$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{g_y t^2}{2}$$

$$y = v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}$$

# Относительность

## Движения



Характеристики механического движения относительно, т.е. траектория, координата, скорость, перемещение могут быть различными в разных системах отсчета. Например, движение лодки рассматривается в системе отсчета, связанной с берегом и с плотом. Скорость и перемещение лодки относительно берега определяются по формулам:


$$v = v_1 + v_2$$

$$S = S_1 + S_2$$




# Относительность

## Движения



$$v_{21} = v_2 - v_1$$

$$v_{21} = v_2 + v_1$$



$$v_{21} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$



Рассмотрим задачи:

**Подборка заданий по кинематике  
(из заданий ЕГЭ 2000-2011 гг. - А1)**





# Рекомендации по выполнению работы.

- Если в задаче предусмотрена возможность графической интерпретации, то выполнение задания целесообразно начинать с построения рисунка.
- Ряд заданий содержит лишние данные, поэтому не следует исходить из того, что все они должны быть использованы.
- Следует внимательно контролировать обозначения на осях координат в графических задачах.
- Ответы типа «Ни одно из приведенных в пунктах 1-3 утверждений неверно» или «Все положения, приведенные в пунктах 1-3, верны» вполне могут быть правильными.
- Не следует решать задания, отталкиваясь прежде всего от интуитивного понимания, лучше использовать физический закон. Однако не следует пренебрегать знаниями, полученными из жизненного опыта.


# Рекомендации по выполнению работы.

- Надо помнить, что все законы имеют границы применимости.
- Решение задачи целесообразно начинать с перевода данных в систему СИ.
- В начале решения задания внимательно прочитайте его условие и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.
- Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какие-то вопросы вызывают у вас затруднения, пропустите их и переходите к следующим заданиям. К пропущенным вопросам можно будет вернуться, если у вас останется время.

**1.** На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех прямолинейно движущихся тел. Какое из тел движется с наибольшей скоростью?




2. Тело движется по окружности по часовой стрелке. Какой из изображенных векторов совпадает по направлению с вектором скорости в точке А?



- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

**3.** Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите скорость тела в конце 5-ой секунды, считая, что характер движения тела не изменяется.




1. 9 м/с
2. 10 м/с
3. 12 м/с
4. 14 м/с

$$a = \frac{\Delta v}{t} = \frac{8 - 2}{3} = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$v = v_0 + at = 2 + 2 \cdot 5 = 12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$


4. Диск радиуса  $R$  вращается вокруг оси, проходящей через точку  $O$  (см. рисунок). Чему равен путь  $L$  и модуль перемещения  $S$  точки  $A$  при повороте диска на  $180^\circ$  ?



1.  $L = 2R; S = \pi R$
2.  $L = \pi R; S = 2R$
3.  $L = 0; S = 2\pi R$
4.  $L = 2\pi R; S = 0$



5. Тело начинает прямолинейное движение из состояния покоя, и его ускорение меняется со временем так, как показано на графике. Через 6 с после начала движения модуль скорости тела будет равен



1. 0 м/с
2. 12 м/с
3. 8 м/с
4. 16 м/с

От 0 до 4 с движение равноускоренное:  $v = at = 2 \cdot 4 = 8$  м/с.

От 4 до 8 с движение равномерное, т.е. скорость, достигнув значения 8 м/с, перестанет изменяться.

**6.** Камень начинает свободное падение из состояния покоя. Определите путь, пройденный камнем за третью от начала движения секунду.

$$H_3 = h(3) - h(2)$$

$$h(3) = g \cdot 3^2 / 2 = 45 \text{ м}$$


$$h(2) = g \cdot 2^2 / 2 = 20 \text{ м}$$

$$H_3 = 45 \text{ м} - 20 \text{ м} = 25 \text{ м}$$

Ответ: **25** (м)

7. Изменение высоты тела над поверхностью Земли с течением времени представлено на графике. Что можно сказать по этому графику о характере движения тела?

1. тело движется по параболе
2. тело движется равномерно
3. тело движется с некоторым ускорением
4. тело движется с ускорением, равным нулю



**8.** Вертолет летит в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с. Из него выпал груз, который коснулся земли через 4 с. На какой высоте летит вертолет? Сопротивление воздуха движению груза не учитывать.

**1. 40 м.**

**2. 80 м.**

**3. 160 м.**

**4. 320 м.**


$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2}$$

$$v_{0y} = 0 \quad h = y = \frac{gt^2}{2}$$

$$h = \frac{10 \cdot 4^2}{2} = 80 \text{ м}$$

8. На рисунке изображен график изменения координаты велосипедиста с течением времени. В какой промежуток времени велосипедист двигался с изменяющейся скоростью?

1. Только от 0 до 3 с
2. Только от 3 до 5 с
3. Только от 5 до 7 с
4. От 3 до 5 с и от 5 до 7 с



9. На поверхность Марса тело падает с высоты 100 м примерно 7 с. С какой скоростью тело коснется поверхности Марса, падая с такой высоты?

$$H = g \cdot t^2 / 2 \Rightarrow g = 2H / t^2$$

$$g = 2 \cdot 100 \text{ м} / (7 \text{ с})^2 = 4.08 \text{ м/с}^2$$

$$v = g \cdot t$$

$$v = 4.08 \text{ м/с}^2 \cdot 7 \text{ с} = 28.56 \text{ м/с}$$

1. 14,3 м/с

2. 28,6 м/с

3. 44,7 м/с

4. 816 м/с

**10.** Движение тела описывается уравнением  $x = 12 + 6,2 t - 0,75 t^2$ .  
Определите скорость тела через 2 с после начала движения.

$$x = 12 + 6,2 t - 0,75 t^2$$

$$v = 6,2 - 1,5 t$$

$$v = 6,2 - 1,5 \cdot 2 = 3,2 \text{ м/с}$$

**1. 0,4 м/с**


**2. 3 м/с**

**3. 3,2 м/с**

**4. 6,2 м/с**

**11.** Скорость первого автомобиля относительно второго изменяется со временем согласно графику на рисунке. В какие моменты времени скорости автомобилей относительно дороги равны?


- 1. с 2 по 4 минуты**
- 2. в момент  $t = 3$  мин**
- 3. при  $t$  от 0 до 1 мин. и больше 5 мин**
- 4. на графике нет такого промежутка времени**





**12.** На рисунке представлен график зависимости координаты тела, движущегося вдоль оси  $Ox$ , от времени. Сравните скорости  $v_1$ ,  $v_2$  и  $v_3$  тела в моменты времени  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ .

- 1)  $v_1 > v_2 = v_3$
- 2)  $v_1 > v_2 > v_3$
- 3)  $v_1 < v_2 < v_3$
- 4)  $v_1 = v_2 > v_3$



**13.** Эскалатор метро поднимается со скоростью  $1 \text{ м/с}$ . Может ли человек, находящийся на нем, быть в покое в системе отсчета, связанной с Землей?

1. может, если движется в ту же сторону со скоростью  $1 \text{ м/с}$
2. может, если движется в противоположную сторону со скоростью  $1 \text{ м/с}$
3. может, если стоит на эскалаторе
4. не может ни при каких условиях

**14.** Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением  $x = 8t - t^2$ . В какой момент времени скорость тела равна нулю?

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

$$x = 8t - t^2$$

$$v_0 = 8 \text{ м/с}$$

$$a/2 = -1 \text{ м/с}^2$$

$$a = -2 \text{ м/с}^2$$

$$v = v_0 + at$$

$$v = 8 - 2t = 0$$

$$t = 4 \text{ с}$$





1. 4 с

2. 8 с

3. 3 с

4. 0 с

**15.** На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени движения. Какой из графиков соответствует равномерному прямолинейному движению?



**16.** Одной из характеристик автомобиля является время  $t$  его разгона с места до скорости 100 км/ч. Сколько времени потребуется автомобилю, имеющему время разгона  $t = 3$  с, для разгона до скорости 50 км/ч при равноускоренном движении?

1)  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  с

2) 1,5 с

3)  $\frac{3}{4}$  с

4)  $\frac{3}{50}$  с

$$100 \text{ км/ч} = 100 \cdot 1000/3600 = 28 \text{ м/с}$$

$$50 \text{ км/ч} = 14 \text{ м/с}$$


$$v = a t$$

$$a = v / t = 28 \text{ м/с} / 3 \text{ с} = 9,3 \text{ м/с}^2$$

$$t_1 = v_1 / a = (14 \text{ м/с} / 9,3 \text{ м/с}^2) = 1,5 \text{ с}$$

**17.** Равноускоренному движению соответствует график зависимости модуля ускорения от времени, обозначенный на рисунке буквой

- 1) А
- 2) Б
- 3) В
- 4) Г



**18.** Мотоциклист и велосипедист одновременно начинают равноускоренное движение. Ускорение мотоциклиста в 3 раза больше, чем у велосипедиста. В один и тот же момент времени скорость мотоциклиста больше скорости велосипедиста

- 1) в 1,5 раза
- 2) в  $\sqrt{3}$  раза
- 3) в 3 раза
- 4) в 9 раз

$$v = v_0 + at$$

$$v_v = at$$

$$v_m = 3at$$

$$\frac{v_m}{v_v} = 3$$

$$v_v$$

**19.** Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста 0,5 м/с<sup>2</sup>. Сколько времени длится спуск?

- 1) 0,05 с;
- 2) 2 с;
- 3) 5 с;
- 4) 20 с

$$a = \frac{\Delta v}{t} \quad t = \frac{\Delta v}{a}$$


$$t = \frac{10 \text{ м/с}}{0,5 \text{ м/с}^2} = 20 \text{ с}$$



**20.** Две материальные точки движутся по окружностям радиусами  $R_1$  и  $R_2 = 2R_1$  с одинаковыми по модулю скоростями. Их периоды обращения по окружностям связаны соотношением

- 1)  $T_1 = 2T_2$       2)  $T_1 = T_2$       3)  $T_1 = 4T_2$       4)  $T_1 = 1/2T_2$

**21.** Автомобиль движется по прямой улице.  
На графике представлена зависимость скорости автомобиля от времени.



**Модуль ускорения максимален в интервале времени**

- 1) от 0 с до 10 с
- 2) от 10 с до 20 с
- 3) от 20 с до 30 с
- 4) от 30 с до 40 с

**Модуль ускорения тем больше, чем больше угол наклона прямой**

**22.** Две материальные точки движутся по окружностям радиусами  $R_1$  и  $R_2$ , причем  $R_2 = 2R_1$ . При условии равенства линейных скоростей точек их центростремительные ускорения связаны соотношением

1)  $a_1 = 2a_2$

2)  $a_1 = a_2$

3)  $a_1 = \frac{1}{2}a_2$

4)  $a_1 = 4a_2$


$$a = \frac{v^2}{R}$$

$$a_1 = \frac{v^2}{R_1}$$

$$a_2 = \frac{v^2}{2R_1}$$

$$\frac{a_1}{a_2} = 2$$

**23.** На рисунке представлен график движения автобуса из пункта А в пункт Б и обратно. Пункт А находится в точке  $x = 0$ , а пункт Б – в точке  $x = 30$  км. Чему равна максимальная скорость автобуса на всем пути следования туда и обратно?



1) 40 км/ч

2) 50 км/ч

3) 60 км/ч






4) 75 км/ч

$$v = \frac{S}{t}$$

$$v = \frac{30 \text{ км}}{0,5 \text{ ч}} = 60 \text{ км/ч}$$

$$v = \frac{30 \text{ км}}{0,6 \text{ ч}} = 50 \text{ км/ч}$$


**24.** На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. График зависимости проекции ускорения тела от времени в интервале времени от 12 до 16 с совпадает с графиком



$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$a = \frac{0 - (-10 \text{ м/с})}{4\text{с}} = 2,5 \text{ м/с}^2$$

25. На рисунке представлен график зависимости скорости  $v$  автомобиля от времени  $t$ . Найдите путь, пройденный автомобилем за 5 с.



Трапеция

1) 0 м; 2) 20 м; 3) 30 м; 4) 35 м

- Пройденный путь равен площади фигуры под графиком скорости

$$S = \frac{5 + 2}{2} 10 = 35 \text{ м}$$

# Литература

- ЕГЭ 2010. Физика: сборник экзаменационных заданий/ Авт.-сост. М.Ю. Демидова, И.И. Нурминский. – М.: Эксмо, 2010.
- Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – М.: " Просвещение ", 2009.
- Тренин А.Е. Физика. Интенсивный курс подготовки к Единому государственному экзамену. – М.: Айрис-пресс, 2007.
- Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// <http://fipi.ru/view/sections/92/docs/>