




физика

*Презентация на тему
«Электрический ток в электролитах»*

учениц 10 В класса

Русаковой Л. и
Кузнецовой Н.




Электролиты

ЭЛЕКТРОЛИТЫ-вещества, обладающие ионной проводимостью; их называют проводниками второго рода – прохождение тока через них сопровождается переносом вещества. К электролитам относятся расплавы солей, оксидов или гидроксидов, а также (что встречается значительно чаще) растворы солей, кислот или оснований в полярных растворителях, например в воде.

Прохождение электрического тока через электролит сопровождается выделением веществ на электродах. Это явление получило название **электролиза**.

Электрический ток в электролитах представляет собой перемещение ионов обоих знаков в противоположных направлениях. Положительные ионы движутся к отрицательному электроду (**катоде**), отрицательные ионы – к положительному электроду (**аноду**).




Отрицательные ионы



Положительные ионы

Вольтамперная характеристика для электролитов.

За счет явления поляризации график смещен. ЭДС поляризации имеет знак, противоположный знаку напряжения на электродах.



Применение электролиза

Катодные процессы :

1. В гальваностегии (никелирование, серебрение).
2. В гальванопластике (изготовление копий); 1838 г., Б. С. Якоби.
3. Получение чистых металлов (медь, алюминий).
4. Электрометаллургия расплавов. Очистка металлов, полученных при выплавке из руды, от посторонних примесей.

Анодные процессы:

1. Промышленный способ получения кислорода и водорода.
2. Оксидирование алюминия
3. Электрополировка поверхностей. (электроискровая обработка, электрозаточка).
4. Электрогравировка.

Фарадей Майкл (22.IX.1791–25.VIII.1867)

Английский физик и химик. Один из основателей количественной электрохимии. Установил (1833–1836) количественные законы электролиза.




Законы электролиза Фарадея

1 При электролизе масса превращенного вещества прямо пропорциональна количеству электричества, прошедшего через электролитическую ячейку.


2 При прохождении через электролит одного и того же количества электричества масса превращенного вещества зависит от массы и заряда ионов вещества.

ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ


Ионы обоих знаков появляются в водных растворах солей, кислот и щелочей в результате расщепления части нейтральных молекул. Это явление называется **электролитической диссоциацией**. Например, хлорид меди CuCl_2 диссоциирует в водном растворе на ионы меди и хлора:



При подключении электродов к источнику тока ионы под действием электрического поля начинают упорядоченное движение: положительные ионы меди движутся к катоду, а отрицательно заряженные ионы хлора – к аноду



ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ



Диссоциация веществ с ионной химической связью:






Схема электролитической диссоциации на примере хлора и натрия



Диссоциация веществ с ковалентной полярной связью



КОНЕЦ