


# Гамма-излучение



# ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ ЭТО

- Гамма-излучение (гамма-лучи,  $\gamma$ -лучи) — вид электромагнитного излучения с чрезвычайно малой длиной волны —  $< 5 \times 10^{-3}$  нм и, вследствие этого, ярко выраженными корпускулярными и слабо выраженными волновыми свойствами.




*Гамма-лучи - это форма самой высокой энергии...*

- ⦿ Гамма-квантами являются фотоны с высокой энергией.
- ⦿ На шкале электромагнитных волн гамма-излучение граничит с рентгеновским излучением, занимая диапазон более высоких частот и энергий.
- ⦿ Гамма-излучение испускается при переходах между возбуждёнными состояниями атомных ядер при ядерных реакциях, а также при отклонении энергичных заряженных частиц в магнитных и электрических полях.
- ⦿ Открыто Полем Виллардом в 1900 году при изучении излучения радия.




*Фотон — элементарная частица, квант электромагнитного излучения.*



*"Единичная" аннигиляция электрона и позитрона*

# ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Гамма-лучи, в отличие от  $\alpha$ -лучей и  $\beta$ -лучей, не отклоняются электрическими и магнитными полями, характеризуются большей проникающей способностью при равных энергиях и прочих равных условиях. Гамма-кванты вызывают ионизацию атомов вещества.



*Художественная  
иллюстрация: ядро  
атома испускает гамма-  
квант.*

Гамма-кванты вызывают ионизацию атомов вещества. Основные процессы, возникающие при прохождении гамма-излучения через вещество:

- Фотоэффект — энергия гамма-кванта поглощается ядром атома, и с внешней оболочки атома вылетает электрон.
- Комptonовское рассеяние (Комптон-эффект)- гамма-квант рассеивается при взаимодействии с электроном, при этом образуется новый гамма-квант, меньшей энергии.
- Эффект образования пар — гамма-квант в поле ядра превращается в электрон и позитрон.
- Ядерный фотоэффект — при энергиях выше нескольких десятков МэВ гамма-квант способен выбивать нуклоны из ядра.

# ЗАЩИТА



Защитой от гамма-излучения может служить слой вещества. Эффективность защиты (то есть вероятность поглощения гамма-кванта при прохождении через неё) увеличивается при увеличении толщины слоя, плотности вещества и содержания в нём тяжёлых ядер (свинца, вольфрама, обеднённого урана и пр.)