


# ГЕБЕР ДАУСТ КЕРТИС

(1872—1942) — АМЕРИКАНСКИЙ АСТРОНОМ.



# «ҮЛКЕН ДАУ»

- Кертис считал, что все расстояния завышены Шепли раз в десять. Кертис поддерживал оценку размеров Галактики, вытекающую из звездных подсчетов, и считал, что шаровые звездные скопления гораздо ближе к нам, чем находит.
- Этот спор касался не только масштабов Галактики, но и природы спиральных туманностей. И разным оказался итог дискуссии по этим двум проблемам

# ДУРЫС

- звезды в скоплениях и в отдаленных частях Млечного Пути ничем особенным не отличаются от звезд в окрестностях Солнца (в этом они были правы);
- относительные расстояния до шаровых скоплений, определенные Шепли, правильны (и это было верно);

# БҰРЫС

- межзвездного поглощения света не существует (а вот это было серьезной ошибкой).
- Шепли опирался на данные по цефеидам и ярким гигантам. Кертис критиковал эти данные и считал, что красные и желтые звезды в скоплениях – карлики, схожие с Солнцем (тогда как на самом деле это были гиганты).

Детали «великого спора» характерные для оценки позиции его участников данные для расстояния до шарового звездного скопления М 13 в Геркулесе (в световых годах):

- по Шепли 36000 по Кертису (первоначальное) 3600
- по Кертису (пересмотренное)
- 8000 по современным данным 25000

Шепли оказался ближе к истине, чем Кертис. Некоторые завышения его оценки связано с пренебрежением межзвездным поглощением света, из-за которого все далекие звезды казались слабее (а потому относились Шепли на более далекие расстояния).

Но в другом вопросе именно Кертис был прав, а Шепли ошибался. Это был вопрос о природе спиральных туманностей. Кертис считал, что это «островные вселенные», подобные нашей Галактике, тогда как Шепли полагал, что это «истинно туманные объекты».