




ЛАЗЕРЫ

© В.Е. Фрадкин, 2004

© Г.Н. Мешкова, 2004

Гиперболоид инженера Гарина




Главная ошибка А.Н.Толстого.

Методами геометрической оптики

Получить такой луч **НЕЛЬЗЯ!**

Вынужденное излучение



В 1917 г. А. Эйнштейн предсказал возможность перехода атома с высшего энергетического состояния в низшее под влиянием внешнего воздействия. Такое излучение называется **вынужденным излучением** и лежит в основе работы **лазеров**.

История идеи

- В 1940 г. В.А.Фабрикант указал на возможность использования вынужденного излучения для усиления электромагнитных волн.
- Н.Г.Басов и А.М. Прохоров и независимо американец Ч.Таунс изобрели квантовый микроволновый генератор (1954).
- Т.Г.Мейман в 1960г. создал квантовый оптический генератор – лазер на кристалле рубина.
- А. Джаван (США) в 1960г. создал первый газовый лазер (на смеси He-Ne).

ЛАЗЕР

- (оптический квантовый генератор; аббревиатура от начальных букв английских слов Light Amplification by Stimulated Emission Radiation - усиление света в результате вынужденного излучения), источник оптического когерентного излучения, характеризующегося высокой степенью монохроматичности, направленностью и большой плотностью энергии.
- Один из основных приборов квантовой электроники. Первый лазер (на рубине) был создан в 1960 Т. Мейманом (США); первый газовый лазер (на смеси He-Ne) - А. Джаваном (США). Главный элемент лазера - активная среда, для образования которой используют различные методы накачки. Разработаны лазеры на основе газовых, жидкостных и твердотельных активных сред (в том числе на диэлектрических кристаллах, стеклах, полупроводниках). Лазеры применяются в научных исследованиях (в физике, астрономии, химии, биологии и других областях), медицине (хирургии, офтальмологии и т.п.), а также в технике (лазерная технология, в том числе создание материалов полупроводниковой электроники, высокоточная обработка поверхностей сверхтвердых материалов и другие методы обработки). Лазеры позволили осуществить эффективную оптическую (в том числе космическую) связь и локацию.



БАСОВ
Николай
Геннадиевич



ПРОХОРОВ
Александр
Михайлович




1964




ТАУНС
Чарльз

Спонтанное и вынужденное излучение


а) Поглощение



б) Спонтанное излучение




в) Вынужденное излучение




- — невозбужденный атом с энергией E_i
- — возбужденный атом с энергией E_j

Схема гелий-неонового лазера:



- 1 – стеклянная кювета со смесью гелия и неона, в которой создается высоковольтный разряд;**
- 2 – катод; 3 – анод;**
- 4 – глухое сферическое зеркало с пропусканием менее 0,1 %;**
- 5 – сферическое зеркало с пропусканием 1–2 %.**

Моделирование работы лазера



Лазер, двухуровневая модель.


E_1 $n_1 = 14$
 E_2 $n_2 = 6$

Поглощение
 Спонтанное излучение
 Вынужденное излучение
 Усилитель света

$N_{\text{вх}} = 19$
 $N_{\text{вых}} = 1$
 $P = 1$

Стоп Сброс

Рубиновый лазер



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ

- Военное дело (лазерная локация, лазерные системы слежения, наведения и т.д.)
- Медицина (хирургия, офтальмология, терапия)
- Связь
- Информационные технологии
- Искусство (зрелищные шоу)
- Голография
- Лазерная сварка, пайка и резка металлов
- Лазерный термоядерный синтез
- Лазерный катализ


Принцип создания голограмм



Образцы лазерных голограмм



Информационные технологии



Лазер для вычислительной техники

Лазеры в военном деле



Американская система боевого ТЕА-лазера

Тактический высокоэнергетический лазер (THEL)



Лазеры в медицине



Лазерная хирургическая установка



Мустанг 017



Мустанг 022-БИО



Мустанг 024



Мустанг 026



Мустанг P-4



Мулат



Мотылек, Мотылек-рефлекс



Муравей



Светодиодные головки



Несадекс

Установки для лазерной терапии