

Молекулярная физика



Автор: Казиев Ш. У..

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

(10 класс)

Цели урока

- 1. Способствовать формированию у учащихся знания молекулярно-кинетической теории идеального газа; выявить причинно-следственные связи между величинами, входящими в уравнение; сформировать понятие «изопроцесс».**
- 2. Создать условия для выявления качества и уровня овладения знаниями и умениями с использованием компьютерных технологий.**

Цели, ориентированные на развитие личности учащегося

- Способствовать эмоционально-ценностному отношению к физическим явлениям в природе.
- Создать позитивные условия для проявления познавательного интереса у учащихся, желания самостоятельного поиска знаний и развития творческого мышления.

Воспитательные цели

- Выявить взаимосвязь теории и эксперимента как критерия истины. Продолжить работу по развитию мышления и мировоззрения школьников.
- Содействовать осознанию учащимися ценностей совместной деятельности на уроке.

Структура урока

- Актуализация знаний.
- Объяснение нового материала.
- Закрепление.
- Домашнее задание.

Единый план изучения газовых законов

- Определение и условия осуществления процесса.
- Уравнение и формулировка закона.
- Историческая справка.
- Экспериментальное исследование справедливости закона.
- Графическое изображение процесса.
- Границы применимости закона.

Уравнение состояния идеального газа

$$p \ V = \frac{m}{M} R T$$


Уравнение
Менделеева-Клапейрона

Закон Бойля-Мариотта

(изотермический процесс)

$$pV = \text{const} \text{ при } T = \text{const}$$

Для газа данной массы произведение давления газа на его объем постоянно, если температура газа не меняется.



Бойль (Boyle) Роберт (25.I.1627–30.XII.1691)




*Английский физик
и химик, член
Лондонского
королевского общества.
Работы Бойля в области
газов помогли ему
сформулировать закон
взаимосвязи между
объемом
газа и его давлением.*

Определись в своих знаниях и проверь свои умения

Назовите процесс:


- 1) изотермическое сжатие;
- 2) изохорное нагревание;
- 3) изобарное нагревание;
- 4) изотермическое расширение;
- 5) изобарное расширение;
- 6) изохорное охлаждение.



1 2 3 4 5 6

Выбери правильный ответ

- 1) $p=const$ T
- 2) $T=const$ p
- 3) $V=const$ T
- 4) $p=const$ V
- 5) $T=const$ V
- 6) $V=const$ p T



1 2 3 4 5 6

Реши задачу

Воздух под поршнем насоса имеет давление 10^5 Па и объем 260 см^3 . При каком давлении этот воздух займет объем 130 см^3 , если его температура не изменится?

- 1) $0,5 \cdot 10^5$ Па; 3) $2 \cdot 10^4$ Па; 5) $3 \cdot 10^5$ Па;
- 2) $5 \cdot 10^4$ Па; 4) $2 \cdot 10^5$ Па; 6) $3,9 \cdot 10^5$ Па

1

2

3

4

5



6

Закон Гей-Люссака

(изобарный процесс)

$$V/T = \text{const}$$
 при $P = \text{const}$

Для газа данной массы отношение объема к температуре постоянно, если давление газа не меняется.



Гей-Люссак (Gay-Lussac)

Жозеф Луи

(6.XII.1778–9.V.1850)

**Французский химик и
физик, член АН в Париже
(1806).**


**В 1802, независимо от
Дж. Дальтона, Гей-
Люссак открыл закон
теплового расширения
газов.**



Определись в своих знаниях и проверь свои умения

Назовите процесс:


- 1) изотермическое сжатие;
- 2) изохорное нагревание;
- 3) изобарное нагревание;
- 4) изотермическое расширение;
- 5) изобарное сжатие;
- 6) изохорное охлаждение.



1 2 3 4 5 6

Выбери правильный ответ

- 1) $p=const$ $V \square$ $T \square$
- 2) $T=const$ $p \square$ $V \square$
- 3) $V=const$ $T \square$ $p \square$
- 4) $P=const$ $T \square$ $V \square$
- 5) $T=const$ $p \square$ $V \square$
- 6) $V=const$ $p \square$ $T \square$



1 2 3 4 5 6

Реши задачу

Газ занимает объём 2м^3 при температуре 273°C . Каков будет его объём при температуре 546°C и прежнем давлении?


- 1) $3,5\text{м}^3$; 3) $2,5\text{м}^3$; 5) 3м^3 ;
- 2) 1м^3 ; 4) 4м^3 ; 6) $1,5\text{м}^3$

1 2 3 4 5 6

Закон Шарля (изохорный процесс)

$p/T = \text{const}$ при $V = \text{const}$


Для газа данной массы отношение давления к температуре постоянно, если объем газа не меняется.



Определись в своих знаниях и проверь свои умения

Назовите процесс:


- 1) изотермическое сжатие;
- 2) изобарное нагревание;
- 3) изохорное нагревание;
- 4) изотермическое расширение;
- 5) изобарное расширение;
- 6) изохорное охлаждение.



1 2 3 4 5 6

Выбери правильный ответ

- 1) $p=const$ $T \square$
- 2) $T=const$ $V \square$
- 3) $V=const$ $T \square$ $p \square$
- 4) $P=const$ $T \square$ $V \square$
- 5) $T=const$ $p \square$ $V \square$
- 6) $V=const$ $p \square$ $T \square$




1 2 3 4 5 6


Реши задачу

Газ находится в баллоне при температуре 288 К и давлении 1,8 МПа. При какой температуре давление газа станет равным 1,55 МПа? Объем баллона считать неизменным.


- 1) 100К; 3) 248К; 5) 456К;
- 2) 284К; 4) 123К; 6) 789К




$$P_1 < P_2$$





Изотермы
в координатах
 pV , VT и pT .



$$T_1 < T_2$$






Погоди мау!

Домашнее задание

На рисунке дан график изменения состояния идеального газа в координатных осях V , T . Представьте этот процесс на графиках в координатных осях P , V и P , T .



СПАСИБО
ЗА
УРОК