

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Физический факультет

Открытие и исследование векторных бозонов в эксперименте ATLAS

Работу выполнила
студентка 218 группы
Токур Я. А.

Научный руководитель
профессор Смирнова Л. Н.


Стандартная модель

Фундаментальными частицами Стандартной модели являются лептоны, кварки и калибровочные бозоны.


Калибровочные бозоны имеют целочисленный спин и являются носителями взаимодействия между фундаментальными фермионами.

Тип взаимодействия	Частицы, на которые распространяется	Калибровочные бозоны	Характеристики калибровочных бозонов
Сильное	Все частицы, имеющие цвет	8 безмассовых глюонов	спин $J = 1$
Электромагнитное	Все частицы, имеющие электрический заряд	Безмассовый фотон	спин $J = 1$
Слабое	Кварки, лептоны, калибровочные бозоны W^+ , W^- , Z	Массивные бозоны W^+ , W^- , Z	$J = 1$, $M_W \sim 80,4$ ГэВ $M_Z \sim 91,2$ ГэВ
Гравитационное	Все частицы	Безмассовый гравитон	спин $J = 2$

ЦЕРН и БАК. Детектор ATLAS



Строение детектора ATLAS



Общая схема БАК

Энергия столкновения протонов достигает 13ТэВ

W- и Z-бозоны

Кванты слабого поля -
массивные частицы

$$M_W \sim 80,4 \text{ ГэВ}$$

$$M_Z \sim 91,2 \text{ ГэВ}$$


$$J = 1$$

Были предсказаны теоретически
задолго до их экспериментального
обнаружения как «промежуточные»
частицы, передающие слабое
взаимодействие.


Впервые наблюдались в 1983 г. в специально
для этого поставленном эксперименте ЦЕРНа.

Открытие W^- и Z^- бозонов

$p + p^* \rightarrow W + X$; $p + p^* \rightarrow Z + X$,
где X - совокупность других частиц.



Протон




Антипротон

$$\begin{array}{ll}
 u + d^* \rightarrow W^+ & u^* + d \rightarrow W^- \\
 u + u^* \rightarrow Z & d + d^* \rightarrow Z
 \end{array}$$



Искать W^- и Z^- бозоны по кварк-антикварковой ветви их распада нецелесообразно. Надёжно из адронного фона выделяются распады W^- и Z^- бозонов на лептоны:

$$\begin{array}{l}
 W^+ \rightarrow e^+ + \nu_{e^*} \\
 W^- \rightarrow e^- + \nu_e \\
 Z \rightarrow e^+ + e^-
 \end{array}$$


Ускоритель SPS



Детекторы UA1 и UA2



Современные измерения W - и Z -бозонов в эксперименте ATLAS




Зачем изучать электрослабые распады?

- Количественные оценки качества работы детектора
- Проверка теоретических расчётов
- Возможность извлечь информацию о ещё не открытых частицах

Моделирование событий в детекторе ATLAS с помощью HYPATIA.

Изображения детектора ATLAS



Гистограммы, построенные на основе измеренных данных

Список исследованных треков и их характеристики

Заключение

1. Векторные бозоны являются важными составляющими СМ
1. Они были открыты на коллайдере SPS в 1982 году.
Наблюдалось 6 событий рождения W -бозонов и 13 событий рождения Z -бозонов
3. На данный момент в эксперименте ATLAS зарегистрировано $\sim 10 \cdot 10^6$ Z -бозонов и $\sim 100 \cdot 10^6$ W -бозонов, что позволяет проверять Стандартную модель
4. С помощью программного пакета HYPATIA были проанализированы события распада $Z \rightarrow e^+ + e^-$