

Поперечные и продольные ВОЛНЫ

ИМОП 2016

В вакууме механическая волна возникнуть не может. Источником волн являются колеблющиеся тела, которые создают в окружающем пространстве деформацию среды.

Для возникновения волны нужна деформация (наличие $F_{упр}$) среды.

Для распространения волны нужна упругая среда.

Бегущая волна - волна, где происходит перенос энергии без переноса вещества.

Бегущая упругая волна- волна, где есть перенос энергии и возникает F упругости в среде распространения.

Среди механических волн мы будем рассматривать бегущие упругие волны.


Возмущение. Волны



Возмущение – изменение некоторых физических величин, характеризующих состояние среды.

Волны - возмущения, распространяющиеся в пространстве, удаляясь от места их возникновения.


Перенос энергии без переноса вещества



Важное свойство всех волн — перенос энергии без переноса вещества. Заядлые рыбаки хорошо знают, что, когда забрасывают удочку, в воде появляются волны, разбегающиеся во все стороны, но поплавок при этом колеблется вверх и вниз, следуя за движением частиц воды. Частицы, как и поплавок, не движутся вслед за волной. Волна же, распространяясь, все дальше несет энергию, которая заставляет двигаться новые и новые частицы.

Продольная волна


Продольные волны это волны, в которых колебания происходят вдоль направления распространения волны.



Однородная среда

Чередование сжатия с разрежением

•rarefaction and compression




Направление колебаний



Направление распространения волны

Поперечные волны

Поперечные волны это волны, в которых колебания происходят перпендикулярно направлению их распространения.




Направление колебаний

Направление распространения волны

T – период колебаний.


Точка 1 колеблется вверх-вниз.

Колебания от неё передаются шнуру.




Поперечная волна

это волна, в которой возмущения ориентированы перпендикулярно направлению ее распространения.





Поперечные волны




Упругие поперечные волны – это волны сдвига. Распространяются только в твёрдых телах.

Продольные волны



Сгущение



Направление
распространения
волны

Разрежение

Упругие продольные волны – это волны сжатия и разрежения. Распространяются в любой среде – твёрдой, жидкой и газообразной. Пример продольной волны - звуковая волна. В результате колебания какого-нибудь упругого тела, например струны, металлического листа, деревянной пластины и т. п., возникает волнообразное распространение продольных колебаний воздушной среды.




Продольная волна

*это волна, в которой возмущения
ориентированы вдоль направления ее
распространения*



Скорость распространения волны

Скорость перемещения гребня или впадины в поперечной волне (сжатий или разрежений в поперечной волне) называется скоростью распространения волны.



Волны переносят энергию с определенной скоростью. Скорость механических волн бывает разная. Например, звуковые волны в воздухе распространяются со скоростью 343 м/с, а в алюминии — 6260 м/с, в воде — около 1500 м/с.



Закрепление пройденного материала

- Что называется волной?
- Какие волны называются поперечными?
- Какие волны называются продольными?
- Каковы условия возникновения волн?
- В каких средах распространяются продольные и поперечные волны?
- Происходит ли в бегущей волне перенос вещества?
- Что называется упругой средой?
- Какие волны - поперечные или продольные - являются волнами сдвига; волнами сжатия и разряжения?

Длина волны


Длина волны – это расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебания.

$$\lambda = u T$$

λ - длина волны,

u - скорость распространения волны,

T - период колебаний.



**Связь длины волны
с частотой колебаний в волне**


$$\lambda = \nu \cdot T, \quad \nu = \frac{1}{T},$$

$$T = \frac{1}{\nu}$$

$$\lambda = \frac{\nu}{\nu}$$

1. В океане длина волны равна 250 м, а период колебаний в ней 20 с. С какой скоростью распространяется волна? *(Ответ: 12,5 м/с)*
1. Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 10 м. Какова частота ударов волн о корпус лодки, если их скорость 3 м/с?
(Ответ: 0,3 Гц)
1. Мимо неподвижного наблюдателя за 10 с прошло 5 гребней волн начиная с первого со скоростью 4 м/с. Какова длина волны и частота колебаний?
(Ответ: 10 м; 0,4 Гц)

Звук



Человек живет в мире звуков. Что же такое звук? Как он возникает? Чем один звук отличается от другого? Сегодня на уроке мы с вами попробуем ответить на эти и многие другие вопросы, связанные со звуковыми явлениями.

Звук (или звуковые волны) — это распространяющиеся в виде волн колебательные движения частиц упругой среды: газообразной, жидкой или твердой.


- Почему же возникают звуковые волны? Это происходит из-за попеременного сжатия и растяжения среды, то есть из-за того, что в среде возникают возмущения (механические колебания среды). И эти возмущения передаются от одних частей среды другим. Таким образом, из-за периодической деформации среды и действия в ней силы упругости, в среде возникают упругие механические волны, которые мы зрительно не видим, зато воспринимаем на слух.

Источники звука -

различные колеблющиеся тела

естественные

- Речь
- Звуки которые издают живые организмы
- Шум воды, ветра, деревьев



искусственные

- Шум машин
- Звуки музыкальных организмов



Процесс распространения ЗВУКОВЫХ ВОЛН



1. Источник звука



2. Передающая среда


-газы

-твёрдые тела

-жидкости



3. Приёмник звука



Скорость звука — это скорость прохождения звуковой волны по материи, окружающей источник звука.

Зависит от:

- плотности среды, в которой распространяется звуковая волна. Сквозь газообразную среду, жидкости и в твердые тела звук проходит с разной скоростью. **В воде звук распространяется быстрее, чем в воздухе. В твердых телах скорость звука выше, чем в жидкостях.** Для каждого вещества скорость распространения звука постоянна.



Интересно знать

- Звук в **вакууме** распространяться **не может**, т.к. здесь нет упругой среды, и поэтому не могут возникнуть упругие механические колебания. В каждой среде звук распространяется с разной скоростью.
Скорость звука в воздухе - приблизительно 340 м/с.
Скорость звука в воде — 1500 м/с.
Скорость звука в металлах, в стали — 5000 м/с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА

1) Высота звука

Высота звука определяется его частотой: чем больше частота колебаний в звуковой волне, тем выше звук. Колебаниям небольшой частоты соответствуют низкие звуки, колебаниям большой частоты - высокие звуки.

Так, например, шмель машет в полете своими крылышками с меньшей частотой, чем комар: у шмеля она составляет 220 взмахов в секунду, а у комара - 500-600. Поэтому полет шмеля сопровождается низким звуком (жужжанием), а полет комара - высоким (писком).



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА

2) Громкость звука

Громкость зависит от амплитуды колебаний в звуковой волне.

За единицу громкости звука принят 1 Бел (в честь Александра Грэхема Белла, изобретателя телефона).

Громкость звука равна 1 Б, если его мощность в 10 раз больше порога слышимости.

На практике громкость измеряют в децибелах (дБ).

1 дБ = 0,1Б. 10 дБ – шепот; 20–30 дБ – норма шума в жилых помещениях;

50 дБ – разговор средней громкости;

70 дБ – шум пишущей машинки;

Звук громкостью свыше 180 дБ может даже вызвать разрыв барабанной перепонки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА

3) Тембр звука

Тембр звука определяется формой звуковых колебаний.

Мы знаем, что ветви камертона совершают гармонические (синусоидальные) колебания. Таким колебаниям присуща только одна строго определенная частота. Гармонические колебания являются самым простым видом колебаний.

Звук камертона является **ЧИСТЫМ ТОНОМ**.

Чистым тоном называется звук источника, совершающего гармонические колебания одной частоты.



Звуки от других источников (например, звуки различных музыкальных инструментов, голоса людей, звук сирены и многие другие) представляют собой совокупность гармонических колебаний разных частот, т. е. совокупность чистых тонов.

Неслышимые звуки для человека

Ультразвуки - упругие колебания и волны, частота которых превышает 15 – 20 кГц.

- Издают ультра звуки дельфины, летучие мыши.

Инфразвук - имеют частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. За верхнюю границу частотного диапазона инфразвука обычно принимают 16—25 Гц. Нижняя граница условно определена как 0.001 Гц.

- Слышат и издают слоны, тигры, киты.

Человеческое ухо устроено так, что воспринимает звуки с частотой от 20 до 18-20 тысяч колебаний в секунду.

Эхо


- **Эхо** — это не что иное, как возвращение звуковых волн, отразившихся от препятствий.
- **Эхолокация** - способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой волны.



Животные используют эхолокацию для ориентации в пространстве и для определения местоположения объектов вокруг, в основном при помощи высокочастотных звуковых сигналов. Наиболее развита у летучих мышей и дельфинов.

Использование эхолокации.

Гидролокатор, или **сонár**, — средство звукового обнаружения подводных объектов.



Эхолот — узкоспециализированный гидролокатор, устройство для исследования рельефа дна водного бассейна.

Ультрасонограф — используют в медицине, благодаря ему можно рассматривать различные органы организма



Шум

- Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.

