


# Движение

## по окружности



# Цели

- Изучить основные характеристики движения:
  - **угловая скорость;**
  - **линейная скорость;**
  - **ускорение;**
  - **период.**
- Рассмотреть всевозможные случаи применения движения по окружности:
  - **вращение тела;**
  - **движение на поворотах;**
  - **движение планет;**
  - **движение заряженных частиц.**

# Характеристики движения

- Линейная скорость,  $V$  (м/с).
- Угловая скорость,  $\omega$  (рад/с).
- Центробежное ускорение,  $a$  (м/с<sup>2</sup>).
- Период обращения,  $T$  (с).
- Частота обращения,  $\nu$  (рад/с).

# Перемещение


Линейное:  $\Delta \vec{s}$

Угловое:  $\Delta \varphi$

При малых углах поворота:

$$\Delta l \approx \Delta s.$$

$$\Delta l = R \Delta \varphi.$$



**Линейное и угловое перемещение при движении тела по окружности.**

# Траектория движения



# Скорость

*Линейная скорость*

$$V = s/t$$

**Угловая скорость**

$$\omega = \phi/t$$

$$V = \square$$

R

Модель. Скорость тела при  
движении по окружности.




# Ускорение

Движение по окружности – это движение с ускорением.

Центростремительное ускорение тела направлено по радиусу к центру окружности.

$$a = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$



**Центростремительное ускорение тела при движении по окружности.**


# Тангенциальное ускорение

При неравномерном движении тела:

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau$$

Тангенциальное ускорение тела:

$$a_\tau = \frac{\Delta v_\tau}{\Delta t}; (\Delta t \rightarrow 0).$$



**Ускорение тела при неравномерном движении по окружности.**



# Координаты


На плоскости движение можно описать с помощью координат  $x$  и  $y$ .

Все величины будут периодически изменяться во времени по гармоническому

закону с

периодом:


$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$$



**Разложение вектора скорости по координатным осям.**

# Условие движения

Для движения тела по окружности необходимо, чтобы на это тело действовала сила, направленная к центру окружности и равная:  
 $-F = mv^2/r$  или  $F = m\omega^2 r$ .




# Вращение шара в вертикальной плоскости

Центростремительное ускорение вызывается равнодействующей сил упругости и тяжести.

В нижней точке:  $R = F_{\text{упр}} - mg$ ,  
направлена вверх.


В верхней точке:  $R = F_{\text{упр}} + mg$ ,  
направлена вниз.



# Движение тела на поворотах

Центростремительное ускорение на поворотах дороги вызывает сила трения.


Для этого водитель автомобиля разворачивает рулем передние колеса.



$$F_{тр} = \mu mg = mv^2 / r$$

$$\mu g = v^2 / r.$$


Спортсмен наклоняет корпус в сторону центра поворота.



# Движение тела на поворотах

При повороте равнодействующая всех сил должна быть направлена к центру поворота.

Для этого на скоростных трассах делают наклон дороги.



У самолета на хвостовом оперении есть руль поворота.




$$R = mv^2/r.$$



# Движение тел в гравитационном поле

Сила гравитационного притяжения сообщает и небесным телам центростремительное ускорение.



Траектории:

**1-круговая;**

**2,3 –эллиптические;**

**4-параболическая;**

**5-гиперболическая; 6-  
траектория Луны.**

Модель.

# Движение планет


Первый закон Кеплера. Орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из фокусов (F) которого находится Солнце.

**F, F'** - фокусы,

**a** – большая полуось,

**P**-перигелий,

**A**-афелий.






# Движение планет

Второй закон Кеплера. Радиус-вектор планеты в равные промежутки времени описывает равные площади.

Третий закон Кеплера.

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{const} \text{ или } \frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}$$








# Движение в магнитном поле

Под действием силы Лоренца заряженная частица в магнитном поле движется по окружности.

Период обращения частицы в магнитном поле:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$


Векторы  $v$ ,  $B$  и  $F_{\text{Л}}$  взаимно перпендикулярны  
 $F_{\text{Л}} = qvB \sin \alpha$ , по окружности радиусом  $R = mv/qB$ .





# Радиационные пояса Земли

**Поток  
заряженных  
частиц, влетая в  
магнитное поле  
Земли, под  
действием силы  
Лоренца начинает  
двигаться от  
одного полюса к  
другому и  
обратно.**



**Радиационные пояса – области, в которых находятся  
частицы задержанные магнитным полем.**

# Строение атома

Планетарная модель атома  
Резерфорда:

**электроны движутся вокруг ядра  
атома по эллипсам.**

