



г. Луганск,
ВНУ им. В. Даля,
«Голубой корпус»

Бранспиз Ю.А.

*Восточноукраинский национальный
университет имени Владимира Даля*

A






П

П

2008

Процесс
Пуассона
как
универсальный вероятностный
процесс для описания
изменения параметров в
системах взаимодействующих
частиц

Ф



Составные части дальнейшего

Аксиологическая

Основные цели автора

Методологическая

Краткая характеристика
используемого метода

Тематическая

Испытания Бернулли и
их приближение
процессом Пуассона

Пример

Аксиологическая часть

- 1. «Законно» ли существование кафедр прикладной физики в университетах ?**
- 2. Является ли «Прикладная физика» научной специальностью ?**

Риторические
вопросы ?

Ответ на первый вопрос
зависит от ответа на
второй вопрос

Университет как высшее учебно-научное заведение



Университет – высшее учебное и научное заведение, в котором изучается вся совокупность дисциплин, составляющих основы научного знания по всем или отдельным отраслям знания

Universitas -
совокупность

1. Организация факультетов по отраслям знаний
2. Организация кафедр (выпускных) по научным специальностям

Ответ на риторический вопрос

Университет

Кафедры


Должно быть соответствие
(«стыковка»)

Специальности


Наука

Существование кафедр
«Прикладной физики»
в университетах будет «законным»,
если будет существовать
научная специальность «Прикладная
физика»

Можно ли включить
в перечень ВАК Украины
новую специальность
«Прикладная физика»?








НАУКА ЛИ ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА ?



ТАКОЙ ВОТ ВОПРОС

Пожалуй вопросом «что такое философия» можно заниматься лишь в позднюю пору, когда наступает старость, а с нею и время говорить конкретно. Действительно, библиография по нашей проблеме весьма скромна. Это такой вопрос, который задают , скрывая беспокойство, ближе к полуночи, когда больше спрашивать уже не о чем. Его ставили и раньше, все время, но слишком уж косвенно и или уклончиво, слишком искусственно, слишком абстрактно, излагая этот вопрос походя и свысока, не давая ему слишком глубоко себя зацепить. .. Слишком хотелось заниматься философией... не доходили до той грубости слога, когда наконец можно спросить – так что же это за штука, которой я занимался всю жизнь?

Ж. Делез, Ф. Гваттари



НАУКА ЛИ ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА ?

Аналогия 2






История формирования технических наук

Г. Галилей


1. Описание природных процессов с целью управления ими для практического использования в инженерных приложениях.
2. Такое изменение реального объекта, которое полностью соответствует теории.
3. Перевод техническим путем реального объекта в идеальное состояние на основе использования открытых теорией законов природы – в целях практики.

Х. Гюйгенс

Реализация замысла: на основе теории – запустить реальный природный процесс в техническом устройстве , сделав его следствием человеческой деятельности.





Методология прикладной физики и методология физики



Общее и различие :

1. В процессе схематизации (формализации) решаемых задач.
2. В процессе замещения реального процесса (явления) математической моделью.
3. В процессе формирования новых теоретических знаний .
4. В характере теоретических знаний и организации их использования



Проблемы демаркации

Прикладная
физика



Физика

Прикладная
математика

Аналогия 4

Математика

Целевая направленность физики и прикладной физики

ФИЗИКА



ПОИСК
ИСТИНЫ


ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИКА



Полезные
модели

*Но полезные модели разрабатывают
и в технических науках*

1-й уровень взаимодействия технических наук и прикладной физики



ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНЫХ РАССУЖДЕНИЙ

Применение формулировок, включающих неточно определенные понятия

Применение утверждений, допускающих частные опровержения

Уточнение в ходе исследования (открытость для уточнения)

Использование аналогий и соответствия

Использование доводов, основанных на частных данных экспериментов

Моделирования дискретного континуумом и континуума дискретностью

Применение практической бесконечности (знаки >> и <<)

Интерполяция и экстраполяция результатов

**Блехман И.И., Мышкис А.Д., Пановко Я.Г. Прикладная математика:
предмет, логика, особенности подходов.– Киев: Наукова думка, 1976.**





Схема испытаний Бернулли








На дне глубокого сосуда
Лежат спокойно п шаров.
Поочередно их оттуда
Таскают двое дураков.

Сия работа им приятна,
Они таскают т минут,
И, вынув шар, его обратно
Тотчас немедленно кладут.

Ввиду занятия такого,
Сколь вероятность велика,
Что первый был глупей второго,
когда шаров он вынул к?

В.П. Скитович




Определение испытаний Бернулли

Дано:

1. Некоторое испытание (физический процесс).
2. В результате испытания событие **S** может произойти или не произойти
3. Вероятность события **S** в каждом из испытаний не зависит от результата остальных испытаний и равна p .
4. Осуществление события **S** – «успех», не осуществление – «неудача».

Пример:

1. **S** – изменение некоторого параметра в системе многих частиц в сторону увеличения («успех») или уменьшения («неудача»); каждое такое изменение – испытание Бернулли.
2. Увеличение некоторого параметра в системе многих частиц на величину менее («успех») или более («неудача») данной.



Закономерности испытаний Бернулли

1. Вероятность того, что в n испытаниях Бернулли событие S произойдет k раз определяется равенством

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k},$$






где C_n^k - число сочетаний из n по k .

2. Пусть n стремится к бесконечности и $p \rightarrow 0$. Пусть также имеет место предел $np \rightarrow \lambda > 0$. Тогда для любого $k > 0$ вероятность получить k «успехов» в n испытаниях схемы Бернулли с вероятностью успеха p стремится к величине

$$\lambda^k e^{-\lambda} / k!$$

То есть, имеет место предельный переход

$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$



Испытания Бернулли как процесс Пуассона

Определение процесса Пуассона:

Вероятность того, что в интервале времени $(t, t + \Delta t)$ произойдет изменение состояния равна $\lambda \Delta t$.






Тогда вероятность того, что в момент времени $t \geq 0$ система находится в состоянии x ($x = 0, 1, 2, \dots$) равна

$$P_x(t) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}.$$

Эту вероятность можно интерпретировать и как вероятность того, что за время t произойдет x изменений.

Если $\lambda = \lambda(x, t)$, то получаем процесс рождения и гибели

Для любого физического процесса всегда можно подобрать соответствующий вид зависимости $\lambda = \lambda(x, t)!$



Уравнение Чепмена-Колмогорова для изменения значения параметра x

$$P(x_0, t + \tau) = P(x_0, t) \cdot [1 - \alpha(x_0) - \beta(x_0)] + \\ + P_0(x_0 + h, t) \cdot \beta(x_0) + P(x_0 - h, t) \cdot \alpha(x_0)$$






(Ч-К)

x_0 - значение параметра X в момент времени t

$\alpha(x)$ - вероятность увеличения значения
параметра X

$\beta(x)$ - вероятность уменьшения значения
параметра X

Это уравнение - уравнение полной вероятности



Общее уравнение для плотности вероятности изменения значения параметра x



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\tau}{2!} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} [\rho(x, t)] + \dots =$$

$$= -\frac{h}{\tau} \cdot \frac{\partial}{\partial x} [\rho(x, t) \cdot [\alpha(x) - \beta(x)]] + \frac{h^2}{2 \cdot \tau} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\rho(x, t) \cdot [\alpha(x) + \beta(x)]] - \\ - \frac{h^3}{3!} \cdot \frac{\partial^3}{\partial x^3} [\rho(x, t) \cdot [\alpha(x) - \beta(x)]] + \dots$$

Применяя к слагаемым уравнения (Ч-К) разложения в ряд Тейлора получим

(ОУПВ)

И справа и слева в (ОУПВ) – бесконечное число слагаемых



Конкретизация вида уравнения для плотности вероятности изменения значения параметра

1






Условие для интервала времени
наблюдения за изменением параметра x

$\tau \rightarrow 0$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{h}{\tau} \cdot \frac{\partial \rho(\alpha - \beta)}{\partial x} + \frac{h^2}{2 \cdot \tau} \cdot \frac{\partial^2 \rho(\alpha + \beta)}{\partial x^2} - \frac{h^3}{3!} \cdot \frac{\partial^3 \rho(\alpha - \beta)}{\partial x^3} + \dots \quad (*)$$

Нет бесконечного числа слагаемых слева

Предельный переход применим не для всех
процессов








Конкретизация вида уравнения для плотности вероятности изменения значения параметра

2

Ограничение числа слагаемых в правой части уравнения (*)
связано с установлением взаимосвязи между
характеристиками изменения параметра x : h и τ

Порядок малости τ определяет порядок малости h

Порядок малости τ
не может превышать порядок малости величины h^n , $n \geq 3$





О двух способах конкретизации вида рассматриваемого уравнения

$$n = 1 \quad \lim_{\tau \rightarrow 0} \left(\frac{h}{\tau} \right) = \text{const}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \frac{h}{\tau} \cdot \frac{\partial}{\partial x} [\rho(x, t) \cdot [\alpha(x) - \beta(x)]]$$

$$n = 2 \quad \lim_{\tau \rightarrow 0} \left(\frac{h^2}{\tau} \right) = \text{const}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \frac{h}{\tau} \cdot \frac{\partial}{\partial x} [\rho(x, t) \cdot [\alpha(x) - \beta(x)]] + \frac{h^2}{2 \cdot \tau} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\rho(x, t) \cdot [\alpha(x) + \beta(x)]]$$



Реализация одного из способов

$$n = 2$$


$$\alpha(x) + \beta(x) = 1$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{h}{\tau} \cdot \frac{\partial}{\partial x} [\rho(x, t) \cdot [\alpha(x) - \beta(x)]] + \frac{h^2}{2 \cdot \tau} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\rho(x, t)]$$

$$\alpha(x) - \beta(x) = C_{\alpha-\beta} = \text{const}$$






$$\frac{h}{\tau} \cdot C_{\alpha-\beta} = V_{cp}$$

$$D = \frac{h^2}{2 \cdot \tau}$$



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} [V_{cp} \cdot \rho(x, t)] + D \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\rho(x, t)]$$

Уравнение диффузии с дрейфом
(Эйнштейна-Смолуховского)



К сравнению способов конкретизации вида уравнения для плотности вероятности случайного изменения значения параметра x




$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -V_{cp} \cdot \frac{\partial \rho(x,t)}{\partial x}$$

1-й способ описания
(процесс Пуассона)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} [V_{cp} \cdot \rho(x,t)] + D \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\rho(x,t)]$$

2-й способ описания
(диффузия с дрейфом)

Соответствующим подбором соотношений констант, характеризующих два способа описания случайного изменения параметра x , можно добиться, что средние и дисперсии этих способов будут одинаковы



Доклад закончен.

Благодарю за внимание

