

Импульс тела. Закон сохранения импульса.



1596-1650 гг

Ренé Декáрт -
французский
математик,
философ, физик
и физиолог

С латинского языка
«**impulsus**» -
импульс – «толчок»
импульс –
«**количество движения**»

Импульс тела – это физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость.


$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{p} \uparrow \uparrow \vec{v};$$



$$p [1 \\ \text{кг}\cdot\text{м/c}]$$





$$\boxed{\vec{F} = m \cdot \vec{a}}$$

$$\boxed{t \cdot \vec{F} = m \cdot \frac{(\vec{v} - \vec{v}_0)}{t} \cdot t}$$

Импульс силы – это произведение силы на время её действия.

$$\vec{F} \cdot t = m \cdot \vec{v} - m \cdot \vec{v}_0 = \Delta \vec{p}$$

$$\vec{F} \cdot t \rightarrow$$

$$F \cdot t$$

Импульс силы равен [изменению импульса тела.]



импульс

Замкнутая система тел – это два или несколько тел взаимодействующих только между собой, и невзаимодействующих с другими телами.



Закон сохранения импульса:

векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остаётся постоянной при любых движениях и взаимодействиях этих тел.

$$m_1 \vec{v}_{01} + m_2 \vec{v}_{02} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$


$$\overrightarrow{m_1 v_{01}} + \overrightarrow{m_2 v_{02}} = \overrightarrow{m_1 v_1} + \overrightarrow{m_2 v_2}$$

$m_1 v_{01}$ - начальный импульс 1 тела


$m_2 v_{02}$ - начальный импульс 2 тела

$m_1 v_1$ - конечный импульс 1 тела


$m_2 v_2$ - конечный импульс 2 тела



Вывод формулы закона сохранения импульса:



$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \text{ (III з. Ньютона)}$$



Вывод формулы закона сохранения импульса:

$$\vec{a}_1 = \frac{\vec{v}_1 - \vec{v}_{01}}{t}$$

$$\vec{a}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_{02}}{t}$$

$$m_1 \cdot \vec{a}_1 = - m_2 \cdot \vec{a}_2$$

$$m_1 \cdot \frac{\vec{v}_1 - \vec{v}_{01}}{t} = - m_2 \cdot \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_{02}}{t}$$


Вывод формулы закона сохранения импульса:

$$m_1 \vec{v}_1 - m_1 \vec{v}_{01} = - m_2 \vec{v}_2 + m_2 \vec{v}_{02}$$



$$-m_1 \vec{v}_{01} - m_2 \vec{v}_{02} = - m_1 \vec{v}_1 - m_2 \vec{v}_2$$

$$m_1 \vec{v}_{01} + m_2 \vec{v}_{02} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$


Проявление закона сохранения импульса:



отдача



*Принцип реактивного движения
имеет широкое практическое
применение в авиации и космонавтике.*





А также в живой природе...

Задача 1.

Поливочная машина с водой имеет массу 6 т и движется со скоростью 36 км/ч. После работы масса машины стала 3 т. Сравнить импульс машины, если она возвращается в гараж со скоростью 54 км/ч.

$$p_1 > p_2$$

Задача 2.

Скорость машины массой 1,5 т возросла с 36 км/ч до 72 км/ч. Чему равен импульс силы, действовавшей на автомобиль?

15
кН·с

Задача 3.

Тело массой 400 г начинает равноускоренное движение из состояния покоя и за время 10 с проходит путь 200 м.

Определить импульс тела в конце 10 с.

16

кг·м/с

Задача 4.

Два вагона массами 20 т и 30 т движутся навстречу друг другу со скоростями 4 м/с и 8 м/с. При столкновении они приходят в сцепку, а затем движутся как одно целое. Определить их скорость движения после сцепки.

3,2 м/с

спасибо за работу!

Д.з.: § 21, упр.20 (1,2)