


Спектральный анализ.



В 1666 году Исаак Ньютона, обратив внимание на радужную окраску изображений звезд в телескопе, поставил опыт, в результате которого открыл дисперсию света и создал новый прибор – *спектроскоп*.

Дисперсия света.




Спектроскоп.



В телескопах для получения спектра используют специальные приборы – *спектрографы*, устанавливаемые за фокусом объектива телескопа.

Спектrogramma (фотография спектра) рассеянного скопления Гиады.



Разложение электромагнитного излучения по длинам волн с целью их изучения называется *спектроскопией*.

Анализ спектров – основной метод изучения астрономических объектов, применяемый в астрофизике.

Изучение спектров позволяет узнать:

- ✓ Качественный и количественный химический состав;**
- ✓ Лучевую скорость звезды;**
- ✓ Температуру звезды;**
- ✓ Давление внутри звезды;**
- ✓ и другие важнейшие свойства астрономических объектов.**

Абсолютно черное тело

Призма



Облако газа


Спектр поглощения

Призма

Призма



Непрерывный спектр



Спектр излучения

Наблюдаемые спектры делятся на три класса:

- ✓ непрерывный спектр. Такой спектр дают твердые тела, жидкости или плотный непрозрачный газ в нагретом состоянии.
- ✓ линейчатый спектр **излучения**. Нагретый разреженный газ испускает яркие эмиссионные линии;
- ✓ линейчатый спектр **поглощения**. На фоне непрерывного спектра заметны темные линии поглощения.

Абсолютно черное тело

Призма



Облако газа


Спектр поглощения

Призма

Призма




Непрерывный спектр



Спектр излучения

**Фотосфера звезд
даёт непрерывный
спектр,
пересеченный
отдельными
темными линиями,
которые возникают
при прохождении
излучения через
более холодные слои
атмосферы звезды.**




Эффект Доплера.

В 1842 году австрийский физик и астроном Христиан Доплер установил, что длина волны λ , принятая наблюдателем, связана с длиной волны источника излучения соотношением:

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{V}{c}\right),$$

где V – проекция скорости источника на луч зрения. Открытый им закон получил название закона Доплера.

Спектры различных звезд.



Законы теплового излучения.

$$\varepsilon = \sigma T^4$$

Этот закон носит название *закон Стефана –
Больцмана*. Константа $\sigma = 5,67$

$\cdot 10^{-8}$ Вт/(м²·К⁴) получила название
постоянной Стефана – Больцмана.

$$\lambda_{\max} = \frac{2,9 \cdot 10^{-3} (\text{К} \cdot \text{м})}{T(\text{К})}.$$

Этот закон носит название *закон Вина*.

Заключение.

- ✓ Спектры звёзд являются линейчатыми спектрами **поглощения**.
- ✓ Изучение спектров дает информацию о температуре, скорости, давлении, химическом составе и о других важнейших свойствах астрономических объектов.