

# **Температурные шкалы и их модели.**

МКОУ Новотроицкая СОШ

# Существует 5 наиболее известных температурных шкал:

- Стоградусная, или шкала Цельсия ( $^{\circ}\text{C}$ )
- Фаренгейта ( $^{\circ}\text{F}$ )
- Абсолютная, или шкала Кельвина (K)
- Шкала Реомюра ( $^{\circ}\text{R}$ )
- Шкала Ранкина ( $^{\circ}\text{Ra}$ )

# Габриель Даниель Фаренгейт (1686-1736)



Родился 24 мая 1686 в Данциге (ныне Гданьск, Польша). Изучал физику в Германии, Голландии и Англии. Почти всю жизнь прожил в Голландии, где занимался изготовлением точных метеорологических приборов.

Шкала Фаренгейта была предложена зимой 1709 года. По этой шкале за нуль принималась точка, до которой в один очень холодный зимний день опустилась ртуть в термометре учёного. В качестве другой отправной точки он выбрал температуру человеческого тела. По этой не слишком логичной системе точка замерзания воды на уровне моря оказалась равной  $+32^{\circ}$ , а точка кипения воды  $+212^{\circ}$ . Шкала популярна в США и Великобритании.

# Цельсий Андерс

## (27.02.1701-25.04.1744)



Андерс Цельсий , шведский астроном и физик. Родился 27 ноября 1701 года в Упсале. Окончил Упсальский университет и с 1730 года до конца жизни был профессором этого университета. При его участии была организована Упсальская обсерватория, директором которой он стал в 1740 году.

В 1742 предложил стоградусную шкалу термометра, в которой за нуль градусов принял температуру кипения воды при нормальном атмосферном давлении, а за сто градусов — температуру таяния льда.

Современная шкала Цельсия введена несколько позже.

# ТОМСОН (Thomson) лорд КЕЛЬВИН, Уильям

26 июня 1824 г. – 17 декабря 1907 г.




Уильям Томсон родился в Белфасте в семье преподавателя математики. Одарённый мальчик уже в десятилетнем возрасте стал студентом университета Глазго. После его окончания, Томсон поступил в Кембриджский университет. Вскоре юный студент опубликовал свою первую работу по теории теплопроводности. Двадцати двух лет Томсон становится профессором в Глазго и занимает кафедру до 1899 г., в течение пятидесяти трех лет. За свои научные заслуги У. Томпсон получил титул лорда Кельвина.

Уильям Кельвин в 1860 году предложил новую модель построения температурной шкалы, исходя из кинетической энергии молекул. Температура в минус 273 градуса (по шкале Цельсия) соответствует нулевой кинетической энергии молекул. Так как ни одно вещество нельзя еще более охладить, то температуру в минус 273 градуса можно считать «абсолютным нулем». В шкале Кельвина за начало взят абсолютный нуль, а каждое деление равно обычному градусу Цельсия.



# Рене Антуан Реомюр (28.2.1683 — 17.10.1757)



Французский естество-испытатель Рене Антуан Фершо де Реомюр родился в Ла-Рошели в семье нотариуса. Получил образование в школе иезуитов в Пуатье. С 1699 г. изучал право и математику в университете Бурже. В 1703 г. продолжил изучение математики и физики в Париже. После опубликования первых трёх работ по математике Реомюр был принят в члены Парижской АН (1708).

В 1730 г. Реомюр описал изобретённый им спиртовой термометр, шкала которого определялась точками кипения и замерзания воды. 1 градус Реомюра равен  $1/80$  части температурного интервала между точками таяния льда ( $0^{\circ}\text{R}$ ) и кипения воды ( $80^{\circ}\text{R}$ ), т. е.  $1^{\circ}\text{R} = 1.25^{\circ}\text{C}$ ,  $1^{\circ}\text{C} = 0.8^{\circ}\text{R}$ . Шкала Реомюра долгое время была распространена в Европе, но в настоящее время вышла из употребления.

# Уильям Джон Макуорн Ранкин (1820-1872)



Шотландский инженер и физик родился 5 июля 1820 года в Эдинбурге, в семье инженера. С 1836 года по 1838 год Уильям учился в Эдинбургском институте. Окончив Эдинбургский университет, работал по сооружению портов и железных дорог. С 1855 профессор университета Глазго. Один из создателей технической термодинамики. Предложил температурную шкалу (шкала Ранкина)

Нуль шкалы совпадает с нулём термодинамической температуры, а по размеру  $1^{\circ}\text{Ra}$  равен  $5/9$  К. Принцип тот же, что и в шкале Кельвина, только по размерности она совпадает не со шкалой Цельсия, а со шкалой Фаренгейта. Данная система измерения температуры распространения не получила.

# Формулы перевода шкал Фаренгейта, Кельвина, Реомюра и Ранкина в шкалу Цельсия.

# Температурные шкалы.



# Литература.

- Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. М.: Наука, 1983. 400 с.
- История физики, пер. с нем., ч. 3, в. 2, М. — Л., 1936.
- Кудрявцев П.С. Курс истории физики. М. : Просвещение, 1982. – 448 с.
- Большая советская энциклопедия. В 30 тт.