


ядерная физика


Авторы:


Караулов Иван и Караулов Михаил.

«Преображенский кадетский корпус»



Ядерные реакции.


$$^4_2 He$$

$$^1_1 H$$

$$^7_3 Li$$



- В 1942 году под руководством Энрико Ферми была впервые осуществлена управляемая ядерная реакция.

Ядерная реакция – изменение атомных ядер, вызванное их взаимодействием с элементарными частицами или друг с другом.



- **. β -распад.**
- $${}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z+1}^{A}Y + \beta^{-}$$
- **. α -распад.**
- $${}_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}$$
- Радиоактивный распад ведёт к постепенному уменьшению атомов радиоактивного элемента.


Для осуществления
реакции частица
должна вплотную
приблизиться к ядру

частица




Но если частицы
заряжены
одноимённо, то их
сближению
препятствуют
кулоновские силы.






По началу использовались только а-частицы. В 1932 году сделали первое превращение атомных ядер с помощью протонов большой энергии. Тогда удалось расщепить литий на две а-частицы:



Открытие нейtronов

Помимо реакций, вызванных заряженными частицами, существуют реакции с нейтронами. Их открыл великий физик Ферми. Открытие таких реакций повернуло ход исследований. Нейтроны лишены заряда и поэтому беспрепятственно входят в атомы и вызывают их превращения:





Также существует такой парадокс: медленные нейтроны гораздо эффективнее быстрых. Поэтому их замедляют или реже используют. А замедляют их в обычной воде.

00321 ☆

00045

Энергия ядерных реакций


Ядерные реакции протекают как с выделением, так и с поглощением энергии. Если кинематическая энергия после реакции становится больше, то считается что энергия выделяется, а если меньше – поглощается.

343
150

993
614

Энергетический выход ядерной энергии – разность энергий покоя ядер и частиц до реакции и после реакции. Может быть как положительным, так и отрицательным.

Цепная реакция.



Коэффициент
размножения
нейтронов

$$K = N_i / N_{i-1}$$



ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

Ядерные силы – силы связывающие протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны по взаимодействию практически не отличаются поэтому в ядерной физике их называют нуклонами (в двух различных состояниях).


Основное свойство

Нуклоны обмениваются между собой частицами, в которых больше в 200 раз. Эти частицы были обнаружены в 1947 году и названы пионами(пи-мезонами).

Ядерные силы являются короткодействующими. На расстоянии до 10^{-15} м сильное взаимодействие нуклонов значительно превосходит электромагнитное и гравитационное, но с увеличением расстояния между нуклонами очень быстро убывает.

Энергия связи ядра

Минимальная энергия, которую нужно задать для разрыва связи в атоме называют энергией связи ядра.


$$E_{\text{св}}$$

Она позволяет объяснить устойчивость атомных ядер, выяснить, какие процессы ведут выделению энергии.

Энергия связи очень велика и равняется:

$$E=mc^2$$

где m – масса ядра, а c – скорость света в вакууме.

Например: образование 4 г гелия сопровождается выделением такой же энергии, как при сгорании 2 вагонов каменного угля!

Удельная энергия связи – отношение $E_{\text{св}}$ ядра к числу нуклонов (A).

Удельная энергия связи ядра в сотни тысяч раз превосходит энергию связи. Эта величина неодинакова. С ростом массового числа A она увеличивается от 1,1 МэВ до 8,8 МэВ, а далее с ростом массового числа убывает до 7,6 МэВ.

Формулы

- $m = \varepsilon/c^2$;
- $m = n\Delta m$
- $m = nM/N_A$
- $E = Pt$