



Учитель географии и биологии
Дробунина Н.О.





Современная фауна материка формировалась, начиная с конца мелового периода в условиях изоляции и мало изменявшегося климата. С этим связаны древность фауны и наличие в ее составе большого числа эндемичных форм. Но, существуют и некоторые общие черты фауны Южной Америки и других материков южного полушария, что свидетельствует о давних связях между ними.


Примером могут служить сумчатые, сохранившиеся лишь в Южной Америке и Австралии.





**Все обезьяны Южной Америки
принадлежат к группе
широконосых, отсутствующих в
фауне Старого Света.**



A satellite-style image of South America, showing the continent's topography and surrounding oceans. The text is overlaid on the left side of the image.

Очень богатая и своеобразная фауна Южной Америки (вместе с Центральной Америкой) принадлежит **Неотропической области** входит в пределы двух ее подобластей — Бразильской и Чилийско-Патагонской.

Наибольшим своеобразием и богатством характеризуются **влажные тропические леса**.

В тропических лесах Южной Америки обитают американские (широконосые) обезьяны, подразделяемые на два семейства — игрунковообразных и цеби









Naveletró





Паукообразные
обезьяны

Из
представителей
отряда
неполнозубых в
тропических
лесах
обитают **ленив
цы**





К жизни на деревьях приспособлены также некоторые муравьеды.



В тропических лесах встречаются хищники из семейства кошачьих: оцелоты, небольшие ягуарунди, а также крупные и сильные ягуары



К лесным животным, охотящимся на деревьях, относятся носухи и кинкажу.



Кинкажу



у

Носухи
и

Копытные, немногочисленные в Южной Америке, в лесах представлены несколькими родами. Среди них тапир, небольшая черная свинья-пекари и малорослые южноамериканские спицерогие олени.



Тапи
р

Свинья -
пекари




Почти на всей территории материка, особенно в амазонских лесах, распространена водосвинка капибара — самый крупный представитель грызунов, длина туловища которого достигает 120 см.



В лесах Южной и Центральной Америки обитает несколько видов **сумчатых крыс(опоссумов)**. Амазонские леса кишат летучими мышами, среди которых есть виды, питающиеся кровью теплокровных животных.



Очень богато представлены в лесах пресмыкающиеся и земноводные. Множество ядовитых змей, ящериц. В реках водятся крокодилы. Из земноводных много лягушек, некоторые из них ведут древесный образ жизни.





Анаконд
а



Собакоголовый удав






В лесах много различных **птиц**. Наиболее типичны крупнейшие из попугаев – ара.



Широко распространены мелкие воробьиные попугайчики и красивые.



Характернейшие представители орнитофауны Южной Америки – колибри.



В лесах обитают также **гоацины**, солнечные цапли и цапли-челноклювы, гарпии — огромные хищные птицы, охотящиеся на молодых оленей, обезьян и ленивцев



В саваннах, лесах и на пашнях водятся представители третьего американского семейства неполнозубых — **броненосцы** — животные, снабженные прочным костным панцирем.





Из
грызунов
здесь
встречаетс
я Вискача





Своеобразными чертами отличается горная фауна Анд. Она включает много **эндемичных** животных, не встречающихся в восточной части материка.



Лам
а



Викунья –
безгорбый
верблюд



Гуанак
о

Альпака – живут только на высокогорных плато Южной Америки



Очковый медведь



Андский кондор



Андский кондор – самая крупная из современных хищных птиц.

Если на голове гребень - это папа, у кондора мамы такого гребня нет.



Copyright Cagan Sekercioglu, naturalphotos.com



Олень
Пуду

Самая крупная бабочка Агриппа



В настоящее время в Южной Америке **под угрозой исчезновения** находятся 161 вид млекопитающих, 269 видов птиц, 32 вида пресмыкающихся, 14 видов земноводных и 17 видов рыб.

