

ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ им. проф. В. В. Алёхина заповедник



[Увеличить карту](#)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ↪ Общие сведения и история
- ↪ Физико-географические условия
- ↪ Растительность
- ↪ Животный мир
- ↪ Состояние экосистем
- ↪ Научная деятельность
- ↪ Библиография

ССЫЛКИ

Пока нет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОРОТКО ОБ ООПТ

• Дата создания

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. В.В. Алехина создан 10 февраля 1935 года Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР.



• Географическое положение

Заповедник расположен в юго-западной части Среднерусской возвышенности в пределах средней полосы лесостепной зоны, на территории Медвенского, Мантуровского, Горшеченского районов Курской области. До 1999 г. включал также участок "Ямская степь" в Белгородской области, ныне включен в состав заповедника "[Белогорье](#)".

• Цель создания


Основными задачами заповедника, определенными при его создании, были: сохранение целинных степных участков в сочетании с лесами различных типов (дубравы, боры, "осиновые кусты"), как комплексов природных условий северных степей для изучения степных биогеоценозов, процесса образования чернозема, взаимоотношений между лесом и степью, влияния леса в борьбе с засухой, для научного обоснования более рентабельного использования природных условий степей северной и средней степной полосы Европейской части СССР для сельского и лесного хозяйства.

• Площадь


5287,4 га

• Количество кластеров

6 (Стрелецкий участок площадью 2046 га, Казацкий участок площадью 1638 га, Баркаловка (2 участка) - 368 га, Букреевы Бармы (2 участка)- 259 га, Зоринский - 495,1, Пойма р. Псел (2 участка) - 481,3



Астрагал ольхонский
Astragalus olchonensis Gontsch






Чёрный журавль
Grus monacha



Стерх, или белый журавль

Grus leucogeranus) — вид журавлей, эндемик северных территорий России.





Журавль- красавка

Anthropoides virgo —

самый маленький и второй по распространённости (после канадского журавля) журавль в мире — его численность оценивается в 200—240 тыс. особей.



Сибирская пестрогрудка

Bradypterus taczanowskius



Лаптевский морж

Odobenus rosmarus laptevi






Малый (тундровый) лебедь

Cygnus bewickii





**Розовая
чайка**
Rhodostethia rosea





Ареал

Произрастает на **Алтае, Урале,** заполярных районах **Якутии,** в горных районах **Восточной Сибири, Западной Сибири** и **Дальнего Востока,** на побережье **Белого и Баренцева морей.**

Родиола
розовая *Rhodiola rosea*



Венерин
бацмачок

Берку

т



Go Ahead

Врочеягодник боровой



Голубинка
Римн





**Дроф
а**



Жук -



**ЗМЕЕЯ
Д**

КИЗИЛЬНИК АЛАУНСКИЙ



КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ



**КРОНШН
ЕП**

Alexey Er




МОРОШКА
A



**САПС
АН**





**СТЕПНОЙ
ЛУНЬ**

ОРЛАН - БЕЛОХВОСТ





**ПАХУЧИЙ
КРАСОТЕЛ**



ПИОН ТОНКОЛИСТН ЫЙ

**ПРОЛОМНИ
К**





**РЯБЧИК
РУССКИЙ**